

Tamizaje de cáncer de cuello de útero en prestadores de salud del SNIS. Uruguay, 2018

Silvana López, Cecilia Reolon, Fiorella Cavalleri. Diploma de Salud Pública, Dpto. de Medicina Preventiva y Social, Fac. Medicina, Udelar.

INTRODUCCIÓN

El cáncer de cuello uterino (CCU) es de gran importancia para la salud pública ya que causa pérdida de años por discapacidad y muerte prematura de las mujeres del mundo, siendo uno de los cánceres con gran potencial de prevención y cura. El Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) prevé una cobertura universal, entendida en sus tres dimensiones: poblacional, prestacional y de protección financiera (1). En esta línea, se conforman los Programas Integrales de Salud incluyendo el Programa Nacional del Cáncer y el “Plan Integral de Atención a la Salud” con prestaciones obligatorias vinculadas al CCU. A pesar de la implementación del SNIS y del marco normativo existente, Uruguay mantiene cifras de morbilidad no aceptables.

OBJETIVO

Conocer la cobertura de tamizaje de CCU en usuarias de 21 a 64 años del SNIS de Uruguay en el año 2018, por institución y subsector (público, IAMPP, Seguro Privado)

MÉTODO


Estudio de tipo descriptivo, en base a 3 fuentes de datos secundarios del MSP y del Sistema Estadístico Nacional, al 30 de setiembre de 2018. La muestra contempló al 95% de las mujeres de 21 a 64 años del SNIS (953.490 casos), usuarias de 36 en 43 prestadores de salud con información. La técnica de tamizaje fue la colpocitología oncológica de A. Babes y G. Papanicolou (PAP), con vigencia de hasta 3 años. Para el procesamiento se utilizó SPSS 25, realizándose un análisis univariado y bivariado.

Tabla 1- Distribución de mujeres de 21-64 años por PAP vigentes según subsector del prestador al que pertenece. Año 2018.

		PAP Vigente		
		SI	NO	Total
Sector de la institución	Público	39,10%	60,90%	100%
	IAMPP	67,60%	32,40%	100%
	Seguros Privados	81,30%	18,7%	100%
	Más de una afiliación	58,80%	41,20%	100%

Fuente: Elaboración propia en base a Meta Asistencial 2; metas-cáncer, SIPCCU, RUCAF-MSP.

Gráfico 1- Porcentaje de mujeres de 21-64 años por PAP vigente según institución. Año 2018.



Fuente: Elaboración propia en base a Meta Asistencial 2; metas-cáncer, SIPCCU, RUCAF-MSP. Nota: El código 99 corresponde al grupo de más de una afiliación.

RESULTADO

Las mujeres pertenecientes a los seguros privados contaron con una cobertura del 81%, en tanto el sector público alcanzó el 39%. (Tabla 1) El porcentaje de mujeres “con PAP vigente” de las instituciones del SNIS, considerando como otra institución “más de una afiliación”, tuvo una mediana de 66,4%, un mínimo de 38,6% y un máximo 83,6%. Trece instituciones de las “37” alcanzaron una cobertura de PAP vigente superior al 70% y 17 una cobertura menor a la media (65,8). (Gráfico 1)

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

La cobertura de tamizaje en CCU en Uruguay por subsector e institución de salud fue heterogénea. Solo 2 instituciones de las 36 estudiadas se acercaron al valor de cobertura de referencia de la OMS (80%). A pesar del aumento del gasto operativo por afiliado de ASSE respecto a las IAMPP (2), y tomando el tamizaje como trazador de las dimensiones de cobertura del SNIS, la brecha entre estos sectores permaneció, posiblemente debido a características socioeconómicas de sus usuarias (3). La metodología que se empleó permite ser replicada para monitorear la situación país post pandemia por la enfermedad COVID-19.

Contacto: silvana.44lopez@gmail.com, cereolon@gmail.com

Agradecemos a Dra. Ima León

(1) https://www.paho.org/uru/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=publicaciones-sistemas-y-servicios-de-salud&alias=468-capitulo-2-pdf&Itemid=307
(2) <https://www.gub.uy/ministerio-salud-publica/comunicacion/publicaciones/desempeno-principales-prestadores-del-snis-2015-2018>
(3) <https://www.gub.uy/ministerio-salud-publica/comunicacion/publicaciones/morbilidad-enfermedades-transmisibles-uruguay-diciembre-2019>