

Quitada la costilla, se constató que ella estaba cruzada de una escavación irregular, ocupando toda la parte esponjosa del hueso, y donde se alojaban las vesículas de equinococosis de origen endógeno en número considerable.

En la fotografía que ilustra esta descripción, se puede observar el aspecto general de la formación parasitaria, así como las cavidades dejadas por la ruptura de algunos hidatidos.

UN CASO DE DESDOBLAMIENTO DE LA VESÍCULA BILIAR

POR EL DOCTOR A. CASSAMAGNAGHI

Aun cuando ya han sido descritas por KITT estas clases de anomalías, desdoblamiento de la vesícula biliar (*vescica bilis divisa*, *vescica fellea duplex*) quien las considera frecuentes en los bovinos, ovinos y felinos, quiero sin embargo dar á conocer el caso encontrado por mí, en el matadero de la Barra de Santa Lucía.

Se trataba de una vaca de cinco años, sacrificada en dicho matadero, la cual presentaba una vesícula biliar bilobada, cuyos lóbulos perfectamente separadas uno de otro venían á unirse al nivel del canal cístico siendo ambas partes de iguales dimensiones.

KITT explica estas anomalías de la manera siguiente : Es posible, dice, que un doble germen primario ó un doble surco del germen vesicular dé origen al desarrollo de una doble vesícula separada, ó también que ésta sea causada por un enlazamiento que se produce al exterior, por medio del tejido mesenquimatoso.