

DE NUESTRA CLÍNICA

La «pica» en los equinos

Me da argumento por esta breve comunicación un caso muy interesante de aberración del gusto, observado en una yegua hospitalizada en nuestra clínica durante este último año académico.

El propietario nos informa, que las razones que lo han impulsado á recurrir á nuestra asistencia, son el alarmante y rápido enflaquecimiento que desde casi un mes ha notado en el animal con grave estado de postración, tos, periodos de diarreas abundantes y anorexia absoluta, mientras que antes el enfermo había presentado apetito normal sofo acusándole el vicio crónico (esta es la expresión usada por el propietario) de comer *arena* famelicamente, aún siempre comiendo regularmente su ración ordinaria; hecho este muy raro, siendo bien conocido que desde el principio de la *pica* el pervertimiento de gusto no deja normal el apetito, por la ingestión diaria de lo que el animal está acostumbrado comer, siendo síntoma característico el rechazo de los alimentos ordinarios.

(Esta anomalía de comer *arena* está en relación con el hecho que el mencionado propietario tiene la explotación de una larga zona de playa sobre el río.)

La sintomatología presente, nos hace asentar el diagnóstico de una grave gastro-enteritis, esta última pseudomembranosa, acompañada por fenómenos de bronco-neumonía crónica.

Los excrementos están constituidos por unas deyecciones de semi-consistencia líquida, en su casi totalidad compuestas de arena, que ha tomado una coloración muy verdosa debido á que los gránulos de arena están atacados por los ácidos digestivos (especialmente biliares.)

La bronco-neumonía es también por cuerpos extraños (gránulos de arena) inspirados por el animal á consecuencia de su viciosa depravación.

Se inició el tratamiento con la administración de purgantes

oleosos y con la ingestión de grandes cantidades de decocciones mujilaginosas (semillas de lino), agregándoles dosis repetidas diarias de salicina (4 á 12 gramos por día y por 4 días). Al tercer día desaparecen las pseudomembranas, y los gránulos de arena han disminuído muy considerablemente, tanto que al séptimo día no se constatan más. Entretanto, se ha iniciado un tratamiento á base de carbonato de cal, fosfato de cal, cloruro de podio y calamo aromático, administrados convenientemente en las dos raciones diarias. El animal tiene una mejoría muy franca, permaneciendo en escena la tos, la irregularidad del ritmo respiratorio, y un marcado estado de excitación nerviosa debido al cambio brusco de vida (de la playa al box, de la cama arenosa á la cama de paja), y, sobretudo, á la aplicación continua de la trompeta que prohíbe todo contacto con las paredes y el suelo, recordando que en los primeros días, durante la alimentación, el animal venía vigilado constantemente.

Al mes, la yegua sale de nuestra Clínica con la normalización fisiológica de toda función del aparato digestivo, y en buen estado de nutrición notándose solo alteración del flanco (aritmia respiratoria). La bronco-neumonía no fué tratada, considerando inútil cualquier medio terapeutico en un caso como el presente. Se aconsejó al propietario la administración, por 30 á 50 días, del licor de Fowler, cloruro de sodio, periodicamente, permanencia de la trompeta y estabulación á pesebre, sin nunca dejar libre el animal en la playa.

He tenido ocasión de ver nuestra viciosa enferma después de cuatro meses. Está en un perfecto estado de engorde, normalizados el apetito y la digestión, pero examinada detenidamente, le podemos constatar el principio de un proceso enfisematoso pulmonar.

DIEGO BLASI.

Cauterización subcutánea y Cloruro de Sodio

Aun que, por la mayoría de los autores modernos y por la casi totalidad de las escuelas hoy en día, se ha abandonado el tratamiento de las claudicaciones crónicas de la región escapulo-humeral, y de la coxo-femural usando la cauterización subcutánea (sistema De Nanzio), he tenido ocasión de experimentarla en un periodo de 18 años de práctica y de clínica, aplicándola con éxito positivo siempre cuando no se trate de combatir *anquilosis, artritis neoformativas* y *osteitis deformantes*.

Este sistema se debe aplicar cuando la claudicación ha pasado al estado crónico, y cuando ya han fallado los otros medios comunes que se adoptan para el tratamiento de las mencionadas claudicaciones, evitando siempre la cauterización superficial que deja rastros indelebiles, y dando la preferencia al fuego subcutáneo, sea por su alto grado de energía, sea por salvar la estética, que no sufre mucho por una cicatriz lineal de 10 á 15 centímetros. No trataré de la técnica operativa conocida universalmente, recomendando solamente la más severa vigilancia del proceso supurativo.

Otro método que pongo en práctica desde un lapso de tiempo de 10 años, y cuyos resultados han sido perseverantemente halagadores, usandolo en las mismas condiciones anátomo-patológicas de las exigidas para la aplicación racional de la cauterización subcutánea, es decir cuando no están comprometidos profundamente los medios articulares, es aquel de las inyecciones multiples de solución saturada de cloruro de sodio, que practico cuando la cronicidad no sea demasiado antigua, usando, las hipodermicas en los casos no graves é intramusculares en los graves.

A pesar que el modernismo acuse de antihumanitarios tanto el primero como el segundo sistema, yo los aplicaré siempre, proclamandolos como los únicos mejores hasta ahora preconizados para el tratamiento de las claudicaciones crónicas de espalda y de anca, cuya rebeldía es tan conocida por todos nuestros colegas.

Movimiento de Clínicas durante el mes de Octubre 1911

MES	ENFERMEDADES	ESPECIES				CLÍNICA		RESULTADOS			OBSERVACIONES
		Equina	Bovina	Canina	Diversas	Interna	Externa	Curados	Mejorados	Muertos	
Octubre	Heridas	11	—	2	—	5	10	5	—	—	
»	Contusiones.	9	—	—	—	2	7	2	—	—	
»	Rupturas musculares	2	—	—	—	1	1	1	—	—	
»	Hematomas	1	—	2	—	—	3	—	—	—	
»	Abcesos	5	—	—	—	—	5	—	—	—	
»	Fistulas	5	—	—	—	1	2	1	—	—	
»	Ulceras de la cornea	1	—	—	—	—	1	—	—	—	
»	Exostosis.	9	—	—	—	2	7	2	—	—	
»	Periostitis.	1	—	1	—	1	1	1	—	—	
»	Carie del maxilar.	1	—	—	—	1	1	1	—	—	
»	Fracturas.	1	—	1	—	1	1	1	—	—	
»	Formas coronarias	1	—	—	—	1	1	1	—	—	
»	Esfuerzos.	10	—	—	—	1	9	1	—	—	
»	Artritis	2	—	—	—	1	1	—	1	—	
»	Senovitis supurada	1	—	—	—	1	1	—	1	—	
»	Tenosinovitis	6	—	—	—	—	6	—	—	—	
»	Tenosis.	5	—	—	—	5	—	5	—	—	
	Transporte	65	—	6	—	19	52	17	2	—	

MES	ENFERMEDADES	ESPECIES				CLÍNICA		RESULTADOS			OBSERVACIONES
		Equina	Bovina	Canina	Diversas	Interna	Externa	Curados	Mejorados	Muertos	
Octubre	Suma anterior	65	—	6	—	19	52	17	2	—	
»	Higromas.	5	—	1	—	1	5	1	—	—	
»	Linfangitis	1	—	—	—	—	1	—	—	—	
»	Clavo de calle.	6	—	—	—	—	6	—	—	—	
»	Razas.	1	—	—	—	—	1	—	—	—	
»	Infosura	5	—	—	—	—	5	—	—	—	
»	Amputación de cola.	—	—	2	—	—	2	—	—	—	
»	Castración	1	—	—	Felino 1	—	1	1	—	—	
»	Lipomas.	—	—	—	Ave 1	—	1	—	—	—	
»	Sarcomas	1	—	—	Ave 1	1	2	—	—	—	
»	Tétano	1	—	—	—	1	—	—	—	1	
»	Otitis	1	—	1	—	—	1	1	—	—	
»	Mastitis	1	—	—	—	1	1	—	—	—	
»	Paraplegia	—	—	1	—	—	—	—	—	—	
»	Conjuntivitis	—	—	—	Felino 1	1	—	1	—	—	
»	Keratitis	—	—	—	Felino 2	2	—	2	—	—	
»	Gastritis	2	—	2	—	—	4	—	—	—	
»	Enteritis	5	—	1	—	—	4	—	—	—	
»	Constipación	—	—	1	—	1	1	—	—	—	
	Transporte.	89	—	15	6	27	83	23	2	1	

Está en asistencia.

MES	ENFERMEDADES	ESPECIES				CLÍNICA		RESULTADOS			OBSERVACIONES
		Equina	Bovina	Canina	Diversas	Interna	Externa	Curados	Mejorados	Muertos	
Octubre	Suma anterior	89	—	15	6	27	83	23	2	1	Esta en asistencia.
»	Intoxicación	—	—	2	—	1	1	1	—	—	
»	Pasteurellosis	—	—	6	—	1	5	1	—	—	
»	Catarro del buche	—	—	—	1	1	—	1	—	—	
»	Laringitis	—	—	—	1	1	—	1	—	—	
»	Neumonía	4	—	—	—	1	—	1	—	—	
»	Enfisema pulmonar	5	—	—	—	1	5	1	—	—	
»	Pleuresía	2	—	—	—	—	2	—	—	—	
»	Pleuro-neumonía	1	—	—	—	—	1	—	—	—	
»	Bronco-neumonía	1	—	—	—	—	1	—	—	—	
»	Difteria	—	—	—	2	2	—	1	—	—	
»	Ascitis	—	—	1	—	1	—	—	—	1	
»	Nefritis	1	—	—	—	1	—	1	—	—	
»	Hemoglobinemia	2	—	—	—	2	—	2	—	—	
»	Conmoción cerebral	—	—	—	1	1	—	—	—	1	
»	Hipertrofia de los cornetes	—	1	—	—	1	—	1	—	—	
	Total	105	1	24	11	40	101	32	2	3	

Movimiento de Clínicas durante el mes de Noviembre 1911

MES	ENFERMEDADES	ESPECIES				CLÍNICA		RESULTADOS			OBSERVACIONES
		Equina	Bovina	Canina	Diversas	Interna	Externa	Curados	Moribundos	Muertos	
Nov'bre	Heridas	16	—	5	—	—	21	—	—	—	
»	Contusiones.	7	—	—	—	—	7	—	—	—	
»	Hematomas	2	—	—	—	—	2	—	—	—	
»	Abcesos	1	—	—	—	—	1	—	—	—	
»	Ulceras	—	—	1	—	—	1	—	—	—	
»	Fistulas	—	—	—	Ave	—	1	—	—	—	
»	Callosidades de la piel	1	—	—	—	—	1	—	—	—	
»	Esfuerzos.	7	—	—	—	—	7	—	—	—	
»	Artritis	—	—	—	Ave	—	1	—	—	—	
»	Higromas	1	—	—	—	—	1	—	—	—	
»	Exostosis.	7	—	—	—	—	7	—	—	—	
»	Luxación.	1	—	—	—	—	1	—	—	—	
»	Mal de cruz.	1	—	—	—	—	1	—	—	—	
»	Fracturas.	2	—	5	—	—	4	—	1	—	
»	Tenositis.	4	—	—	—	—	5	—	—	—	Está en asistencia.
»	Distensión de los flexores	1	—	—	—	—	1	—	—	—	
»	Clavo de calle	2	—	—	—	—	2	—	—	—	
»	Transporte	55	—	9	2	5	61	2	—	—	

MES	ENFERMEDADES	ESPECIES				CLÍNICA		RESULTADOS			OBSERVACIONES
		Equina	Bovina	Canina	Diversas	Interna	Externa	Curados	Mejorados	Muertos	
Nov'bre	Suma anterior	53	—	9	2	3	61	2	—	—	
»	Encastilladura	1	—	—	—	—	1	—	—	—	
»	Navicular	1	—	—	—	—	1	—	—	—	
»	Infosura	3	—	—	—	1	2	1	—	—	
»	Hernias abdominales	2	—	—	—	1	1	—	—	1	
»	Flemón coronario	1	—	—	—	—	1	—	—	—	
»	Keratitis	1	—	—	—	—	1	—	—	—	
»	Mamitis	—	1	—	—	—	1	—	—	—	
»	Tétano	2	—	—	—	2	—	1	—	1	
»	Torsión del útero	1	—	—	—	1	—	—	—	—	
»	Linfangitis	1	—	—	—	1	—	—	—	—	Está en asistencia.
»	Parálisis del pene	1	—	—	—	1	—	—	—	—	Está en asistencia.
»	Osificación de los cartilagos pl.	1	—	—	—	1	—	1	—	—	
»	Sarcomas	1	—	—	—	—	2	—	—	—	
»	Sarna	5	—	1	Ave	—	6	—	—	—	
»	Actinomicosis	—	1	—	—	1	—	—	—	—	Está en asistencia.
»	Transporte	74	2	10	3	12	77	6	—	2	

MES	ENFERMEDADES	ESPECIES				CLÍNICA		RESULTADOS			OBSERVACIONES
		Equina	Bovina	Canina	Diversas	Interna	Externa	Curados	Mejorados	Muertos	
Nov'bre	Suma anterior . . .	74	2	10	3	12	77	6	—	2	
»	Corea.	—	—	2	—	1	1	—	1	—	
»	Ascitis	—	—	1	Felino 1	1	1	—	—	—	
»	Urticaria	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
»	Gengivitis	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
»	Gastritis	—	—	6	Felino 1	2	5	2	—	—	
»	Enteritis catarral	1	—	3	—	—	4	—	—	—	
»	Enteritis hemorrágica	—	—	5	—	—	5	—	—	—	
»	Cólicos	1	—	—	—	—	1	—	—	—	
»	Pasteurelosis	—	—	8	Ovino 1	1	8	—	—	1	
»	Hepatitis	—	—	1	—	—	1	—	—	—	
»	Nefritis	—	—	—	Ovino 1	1	—	1	—	—	
»	Bronquitis	1	—	2	—	—	3	—	—	—	
»	Neumonía	5	—	—	—	1	2	1	—	—	
»	Enfiseña pulmonar	11	—	—	—	—	11	—	—	—	
»	Tifo:dea	—	—	—	—	1	—	—	—	—	
»	Piroplasmosis	—	2	—	—	—	—	—	—	—	Está en asistencia.
»	Difteria	—	—	—	Ave 1	1	—	1	—	—	Están en asistencia.
	Total	94	4	36	8	25	119	11	1	3	