

Actualmente usamos el oxicianuro de mercurio en la proporción de 1 por 5.000 y añadiéndolo en solución en 50 cc. de agua destilada caliente después de filtración de la masa.

En nuestro laboratorio poseemos preparaciones tratadas por este método que llevan ya dos años de conservadas sin que en ellas se note la menor alteración y que poseen colores tan vivos como en el momento de recogerlas.

Como última precaución, aconsejamos procurar el cierre hermético de los recipientes, de lo contrario la lenta disecación de la gelatina la obscurece en las zonas superiores.

DE NUESTRA CLÍNICA

Eczema descamante en los animales importados

La mayoría de los animales importados presentan una forma clásica de dermatopatía, muy conocida en nuestro país y que á veces, al simple diagnóstico macroscópico ha sido confundida con la sarna.

Esta forma ataca especialmente á los vacunos en un buen estado de nutrición y es por lo general localizada, si bien puede generalizarse si se descuida el aseo del animal.

Según mi modo de ver, su etiología se reduciría á la siguiente: estos animales criados en países de clima fresco y bastante húmedo como lo son Inglaterra y Francia (puntos de origen de la gran mayoría de nuestros animales importados), sufren un cambio demasiado brusco al atravesar la línea ecuatorial en su viaje hacia nuestras playas y al llegar á nuestro país, dado su clima templado y aire seco.

Por un lado, el estado pletórico, el cambio brusco de temperatura, la sequedad de la atmósfera y por otro, la falta de higiene á bordo son condiciones todas que se unen para provocar una inflamación de la piel traducida por una abundante descamación epitelial.

En mi práctica privada y en la clínica de la Escuela, mi inter-

vención ha tendido, sobre todo, á la completa higienización de la piel, baños generales con jabón común y cepillo, agregando al agua el 1 % de creolina Pearson ó el 1/2 % de lisol ó lisoformo; al mismo tiempo unturas parciales y alternadas sobre las regiones afectadas con una fórmula que me ha dado resultados positivos en 12 á 15 días. La fórmula para el eczema localizado, es la siguiente :

Rp.:	Acido salicílico	50	gramos
	Creosota pura	50	»
	Azufre	200	»
	Almidón	300	»
	Vaselina	1000	»

Se frota sobre la parte atacada, después del baño ya mencionado, durante 1 á 2 minutos y se repite la medicación todos los días y mientras dure el eczema.

A veces se presenta á consecuencia del uso de la pomada, una rubefacción que dura algunos días; si no desapareciera, se suspende la aplicación de la pomada por algunos días y se aplican baños alcalinos.

Conviene ordenar una alimentación alibile, de fácil digestión, y con mucho verde, y agregar al agua de bebida, sales alcalinas, como sulfato ó bicarbonato de soda, etc

Para los casos de eczema generalizado, utilizo la fórmula siguiente :

Rp.:	Creosota pura	140	cc.
	Lisoformo	70	»
	Alcohol á 95°.	1000	»
	Aceite lino	} aa.	3000 »
	» olivas		

En cuanto á su aplicación, sigo las reglas indicadas para la fórmula anterior y cuidando hacerla parcial y alternativamente.

En los casos rebeldes á estas fórmulas agrego á cada una, de 300 á 500 cc. de tintura de yodo.

El tratamiento es algo largo, pero de buenos resultados y debe ser completado con medidas generales de higiene y especialmente en las que se refieren á la cama.

DIEGO BLASI.

Tratamiento de la tristeza

Bajo el punto de vista de la terapéutica racional y como experiencia, aconsejamos el siguiente tratamiento contra la tristeza, que nos ha dado buenos resultados en tres ó cuatro casos tratados y que convendría ensayar en mayor escala.

a) Inyecciones endovenosas de clorhidrato de quinina á dosis de 15 á 25 gramos según la talla, disueltos en 4 á 8 litros de suero fisiológico, agregando en los casos de adinamia cardíaca citrato de cafeína 2 á 5 grs. diarios.

b) Por vía digestiva — Bicarbonato de soda 200 á 400 gramos diarios en forma líquida ó en electuario y durante 7 á 8 días.

c) Al principio del tratamiento un purgante salino con un desinfectante intestinal; he usado la fórmula siguiente:

Rp.: Naftol B 15 á 25 grs.
Sulfato de soda 800 » 1.200 »

según la talla y en 2 veces.

d) Refrigeración en la región renal por chorro continuo.

e) Si la hematuria es abundante, utilizar las inyecciones hipodérmicas de ergotina á la dosis de 4 á 10 gramos repetidas tres veces al día.

Como tratamiento preventivo, sería interesante ensayar un tratamiento análogo al que en la especie humana se emplea para combatir el paludismo, y que consiste en administrar dosis crecientes y máximas de licor de Fowler, antes de llevar los animales á las zonas infestadas de garrapatas.

DIEGO BLASI.

Un caso de bocio en el caballo

Enfermo núm 7008. — Equino macho, 5 años. Entrado el 25 de febrero de 1909.

Este enfermo fué traído al consultorio, por un pequeño tumor localizado que resultó ser una hipertrofia del cuerpo tiroide, rodeado de una zona inflamatoria debido á los cáusticos que su propietario le había puesto para curarlo.

El tumor no causaba ningún disturbio, pues el estado general del animal era excelente, no obstante lo cual aconsejamos la operación, previendo los trastornos que podría ocasionar su desarrollo; pero el propietario no se resolvió, quedando en traerlo más adelante si llegase á notar que crecía. Tres meses más tarde, volvió al Hospital el mismo enfermo, que había cambiado de propietario.

Según su nuevo propietario el animal se fatigaba mucho al extremo de que era completamente inútil para el trabajo, lo que efectivamente pudimos comprobar haciendo galopar un momento al enfermo; la dificultad respiratoria era tal, que después de un corto ejercicio, el animal se rehusaba en absoluto á caminar, separando los miembros anteriores para dar mayor amplitud al torax y presentando todos los síntomas de una asfixia inminente.

Al examinar la tráquea, constatamos la hipertrofia del cuerpo tiroide del lado izquierdo, lo que nos llevó á identificar el enfermo. El tumor había cuadruplicado de volumen, aunque al exterior casi ni se notaba. De forma ovoide, liso, se extendía sobre la tráquea comprimiéndola de tal modo, que su pus estaba reducida á la mitad, lo que explicaba la dificultad respiratoria.

Resuelta la operación, se realizó con toda facilidad, bajo anestesia por el cloroformo, pues el tumor, aunque rodeado de vasos y nervios importantes, solo estaba adherido á ellos por un tejido conjuntivo flojo, excepto al vago, con el cual se unía íntimamente, lo que hacia necesario una prolija disección, y por algunos cordones fibrosos que lo unían al homóplato hiodiano y otros músculos del cuello. La hemorragia fué insignificante, pues habiendo hecho una incisión amplia, nos fué fácil ligar

las anteriores tiroidianas y las ramas más importantes que en esa región se desprenden de la carótida. (1)

Un mes después, el enfermo estaba perfectamente curado, la deformación de la tráquea había casi completamente desaparecido y con ella la dificultad respiratoria, comprobándose una vez más que la tiroidectomía en los equinos no tiene ninguna consecuencia, contrariamente á lo que sucede en el hombre, el perro y otros carnívoros.

ARTURO INCHÁURREGUI

(1) El tumor pesó 550 gramos y el estudio anátomo-patológico demostró que se trataba de una degeneración coloide del cuerpo tiroide, con hipertrofia del órgano y tendencia á la transformación fibrosa.

MOVIMIENTO DE CLÍNICA

A continuación van los cuadros correspondientes al movimiento habido en las Clínicas de la Escuela durante el mes de Agosto ppdo. :

MES	ENFERMEDADES	ESPECIES				CLÍNICA		RESULTADOS			OBSERVACIONES
		Equina	Bovina	Canina	Diversas	Interna	Externa	Curados	Mejorados	Muertos	
Agosto	Laringitis	—	—	—	Aves 1	1	—	—	—	—	Está en asistencia.
»	Bronquitis	5	—	—	—	—	5	—	—	—	Uno está aun en asistencia.
»	Neumonía	5	—	—	—	2	1	1	—	—	Uno está en asistencia.
»	Bronco-neumonía	2	—	—	—	2	—	—	—	—	
»	Enfisema pulmonar	1	—	—	Aves 2	2	1	1	—	—	
»	Difteria	—	—	—	—	2	—	2	—	—	
»	Infección intestinal	—	—	—	—	2	—	—	—	—	
»	Gastro-enteritis	—	—	—	—	1	—	—	—	—	Está en asistencia.
»	Cólicos	1	—	—	—	1	—	—	—	—	
»	Conmoción visceral	—	—	—	—	1	—	—	—	—	
»	Anasarque	1	—	—	—	1	—	—	—	—	
»	Hemoglobinemia	1	—	—	—	1	—	—	—	—	
»	Cistitis	1	—	—	—	1	—	—	—	—	
»	Nefritis	—	—	—	Ovino 1	—	—	—	—	1	
»	Mamitis	—	1	—	Cap'os 1	1	1	1	—	—	Está en asistencia.
»	Actinomicosis	—	1	—	—	1	—	—	—	—	El interno es un bovino.
»	Reumatismo muscular	—	—	—	Cap'os 1	1	1	1	—	—	
»	Rabia	—	—	—	—	2	—	—	—	—	
»	Tiña tonsurans	—	—	—	—	1	—	—	—	—	Está en asistencia
»	Tuberculosis	—	—	—	—	1	—	—	—	—	Está en asistencia.
»	Corea	—	—	—	—	1	—	—	—	—	
»	Contusiones	4	—	—	—	1	3	—	—	—	El interno está en asistencia.
»	Heridas	1	—	—	—	2	—	—	—	—	Los dos están en asistencia.
»	Exostosis	4	—	—	—	2	2	—	—	—	Están en asistencia.
»	Formas	5	—	—	—	—	5	—	—	—	
»	Transporte	25	2	10	6	27	15	9	—	6	

MES	ENFERMEDADES	ESPECIES				CLÍNICA		RESULTADOS			OBSERVACIONES
		Equina	Bovina	Canina	Diversas	Interna	Externa	Curados	Mejorados	Muertos	
Agosto	Suma anterior	25	2	10	6	27	15	9	—	6	
»	Fracturas	2	—	—	—	2	—	1	—	1	Dos estan en asistencia.
»	Esfuerzos	10	—	—	—	4	6	2	—	—	Uno está en asistencia.
»	Sinovitis	2	—	—	—	1	1	1	—	—	Está en asistencia.
»	Linfangitis	2	—	—	—	1	2	—	—	—	
»	Infosura aguda	5	—	—	—	1	1	—	—	1	
»	Parálisis del radial	1	—	—	—	—	1	—	—	—	
»	Reumatismo articular	1	—	—	—	—	1	—	—	—	
»	Hidartrosis	1	—	—	—	1	2	1	—	—	
»	Tenositis	1	—	—	—	—	1	—	—	—	
»	Artritis	2	—	—	—	—	2	—	—	—	
»	Abcesos.	2	—	—	—	—	2	—	—	—	
»	Afección navicular	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
»	Hernia ventral.	1	—	—	—	—	1	—	—	1	
»	Ulceras de la córnea	—	—	1	—	—	1	—	—	—	
»	Keratitis.	1	—	2	—	—	1	2	—	—	El interno es un canino.
»	Neuritis.	1	—	1	—	—	1	—	—	—	Fue sacrificado por orden del propietario.
»	Acroburstitis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Está en asistencia.
»	Castración	—	—	1	—	—	—	—	—	—	Está en la Clínica.
»	Conjuntivitis	—	—	1	—	—	—	—	—	—	Está en asistencia.
»	Enteritis.	—	—	1	—	—	—	—	—	—	
»	Pasteurellosis canina	—	—	5	—	4	1	1	—	2	Uno está en asistencia.
»	Ulceras	3	—	—	—	2	1	2	—	—	
	Total	62	2	22	6	49	42	18	—	11	