

5.º Iguales indicaciones que las del núm. 4 cuando se varíe en cualquier sentido el trabajo que efectúen habitualmente.

(*Continuara*).

DE NUESTRA CLÍNICA

Larvas de *Oestrus* – Localización cerebral

A pesar de haber recorrido minuciosamente la literatura veterinaria no he encontrado ninguna descripción de casos análogos en la especie ovina en la que tuve ocasión de observar el presente. Solamente hallé un caso parecido, relatado por ZOLL pero en un potrillo que manifestaba en vida una tendencia á moverse hacia la derecha y en la autopsia presentó localizaciones de larvas de *oestrus equinus* (*gastrophilus equi*).

Trátase en el caso actual de una enfermedad parasitaria cuyo asiento único es la mucosa pituitaria y los senos frontales, siendo rara la localización en el cerebro, el que ofrece además la particularidad de no haber manifestado síntomas inherentes á los trastornos ocasionados por tal localización en un punto determinado de dicho órgano

El enfermo es un carnero Romney Marsh, puro, nacido en el país de 1 1/2 año de edad, criado á galpón, no teniendo en sus antecedentes mórbidos nada de importante, salvo la observación hecha por el propietario desde algunos meses antes de mi intervención de un estado de somnolencia continúa que había aumentado progresivamente. Atrajo sobre todo la atención del propietario el estado de anorexia muy pronunciado, una disminución progresiva de la sensibilidad, y la casi anulación de la acuidad visual, síntomas que lo indujeron á solicitar mis servicios.

El estado general del animal no es satisfactorio; hay un enflaquecimiento bastante pronunciado, las mucosas aparentes estan muy pálidas, con excepción de la conjuntiva que presenta arborizaciones congestivas muy pronunciadas; la vista se pre-

senta muy apagada; en la marcha voluntaria el animal demuestra incoordinación de los movimientos con tendencia á moverse hacia la izquierda; hay rigidez y contractura de los músculos de la nuca; la cabeza está inclinada hacia la izquierda, hay hiperestesia á la presión digital de la caja craneana y sobre todo acen- tuada en los senos frontales; introduciendo un dedo en los con- ductos auditivos se nota mayor sensibilidad en el derecho; la temperatura rectal es normal como así mismo el ritmo cardiaco mientras que el ritmo respiratorio se halla disminuído. El exá- men oftalmoscópico revela la parálisis de la pupila y congestión del fondo del ojo.

Basado en esta sintomatología, diagnóstico cenurosis ó neo- plasia cerebral en el lado derecho.

Tratamiento. Un drástico enérgico por la vía bucal, y aplica- ciones refrigerantes por hielo en la cabeza.

A los tres días el animal muere.

A la autopsia no se nota nada de anormal en las dos cavi- dades esplánicas, salvo algunas señales de anemia; mi atención se concentra sobre todo en el exámen prolijo de la cavidad cra- neana en la que noto una hiperemia no muy pronunciada de las meninges, un pequeño aumento del líquido cefálico de color algo rosado, é hiperemia de los vasos córtico-cerebrales y del plexus coroideo. En el ventrículo lateral derecho, encuentro una larva típica de *oestrus ovis* con dilatación excéntrica del ventrículo, y aumento, en gran cantidad, del líquido céfalo-ra- quideo, el que, comprimiendo las capas ópticas y regiones ce- rebrales vecinas, daba lugar á la amaurosis y demás lesiones nerviosas.

DIEGO BLASI.

Operación de hernia inguinal crónica en un ovino conservando el testículo

En los primeros días de Octubre entró en clínica un ovino macho presentando al nivel de la bolsa del lado izquierdo, un tumor indoloro, blando, fluctuante, incompletamente reductible, que descendía más abajo del corvejón; por una palpación

metódica se advertía el testículo atrofiado empujado hacia el fondo y atrás de la cavidad vaginal; el cordón seguía el borde posterior del tumor.

Colocado el animal en posición dorso-lumbar y procediendo al taxis mediato se conseguía una incompleta reducción la cual facilitaba la palpación del anillo herniario, es decir, del anillo inguinal superior que se mostraba excesivamente desgarrado, midiendo su mayor diámetro unos 8 centímetros; el ángulo posterior del mismo daba pasaje al cordón testicular adelante del cual descendía unos pocos centímetros en la cavidad vaginal un ansa intestinal muy suelta y móvil.

Diagnóstico: — Epiplo enterocele inguinal crónica.

OPERACIÓN

Kelotomía sub-cutánea — Posición dorso-lumbar — Anestesia — Reducción parcial por taxis mediato.

1.º tiempo -- Siguiendo una dirección paralela al diámetro antero-posterior del anillo inguinal, incisión (8-10 cents.) del escrotón dartos y laceración del conjuntivo que rodea al anillo,

2.º tiempo — Incisión longitudinal de la vaginal siguiendo el gran eje de la hernia, lo que dió lugar á la salida del epiplón debido á la presión bajo la cual se encontraba.

3.º tiempo — Reducción llevando el testículo hacia atrás y abajo; primero del ansa intestinal, luego del epiplo, comenzando por la porción más próxima al anillo inguinal.

4.º tiempo — Sutura del anillo herniario dejando libre el ángulo posterior del mismo para dar pasaje al cordón testicular.

5.º tiempo — Sutura del dartos y escroton.

Vendaje.

Dieta las 24 primeras hora que siguieron la operación. Al otro día apareció fiebre (42.º) administrándole salol y bensonaftol. Al 3er. día desaparición de la fiebre y vuelta del apetito. Al 6.º día se le quitó el vendaje presentándose la cicatriz con el mejor aspecto, no dudándose ya que cerrara por primera intención. Formación de un plastron fibroso asegurando la no reincidencia.

Hoy, 40 días después de la operación, el animal se encuentra

perfectamente curado, habiendo conservado el uso completo de sus funciones genitales.

DIEGO BLASI.

MOVIMIENTO DE CLÍNICA

A continuación van los cuadros correspondientes al movimiento habido en las Clínicas de la Escuela durante el mes de Octubre ppdo.:

MES	ENFERMEDADES	ESPECIES				CLÍNICA		RESULTADOS			OBSERVACIONES
		Equina	Bovina	Canina	Diversas	Interna	Externa	Curados	Mejorados	Muertos	
Oc'tbre	Laringitis	1	—	1	—	1	—	1	—	—	El interno es un canino.
»	Bronquitis	7	—	1	—	1	—	1	—	—	
»	Bronco-neumonía	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
»	Enfisema pulmonar	2	—	—	—	—	—	—	—	—	
»	Neumonía	4	—	—	—	—	—	—	—	—	
»	Pleurésia	1	—	—	—	—	—	—	—	—	Está en asistencia.
»	Adenitis equina	5	—	—	—	2	—	—	—	1	Uno está en asistencia.
»	Gastritis	—	—	1	—	—	—	—	—	—	
»	Gastro-enteritis	—	1	1	Ovino 1	3	—	2	—	—	El canino está en asistencia.
»	Infección intestinal	1	—	—	—	2	—	2	—	—	
»	Indigestión por sobrecarga	—	1	—	—	—	—	—	—	1	
»	Cólicos	5	—	—	—	1	—	—	—	1	
»	Ascitis	—	—	1	—	—	—	—	—	—	Está en asistencia.
»	Tétano	2	—	—	—	1	—	—	—	—	Los dos estan en asistencia.
»	Hemoglobinemia	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
»	Pasteurelosis canina	—	—	1	—	—	—	—	—	1	
»	Sarna	—	—	1	—	—	—	—	—	—	
»	Tiña tonsurans	—	—	1	—	—	—	—	—	—	
»	Ecsema cutáneo	—	—	2	—	—	—	—	—	—	Uno está en asistencia.
»	Rabia	—	—	1	—	—	—	—	—	—	
»	Revisación sanitaria	—	1	—	—	—	—	—	—	—	
»	Gangrena seca	—	—	—	Aves 1	1	—	—	—	—	Está en asistencia.
»	Actinomicosis	—	—	1	—	—	—	—	—	—	
»	Paraplegia á frío	—	—	1	—	—	—	—	—	—	
	Transporte	27	5	12	2	25	25	9	—	5	

MES	ENFERMEDADES	ESPECIES				CLÍNICA		RESULTADOS			OBSERVACIONES
		Equina	Bovina	Canina	Diversas	Interna	Externa	Curados	Mejorados	Muertos	
Oc'bre	Suma anterior	27	5	12	2	23	23	9	—	5	
»	Parto distócico.	—	2	—	—	2	—	1	—	1	
»	Higromas	1	1	—	—	2	—	—	—	—	
»	Reumatismo articular	10	—	—	—	1	7	1	—	—	
»	Heridas	3	—	—	—	3	3	2	—	—	Uno está en asistencia.
»	Contusiones	8	—	—	—	2	6	2	—	—	Está en asistencia.
»	Exostosis	5	—	—	—	1	2	—	—	—	
»	Tenositis	3	—	—	—	1	3	—	—	—	
»	Sinostitis.	2	—	—	Ovino 1	1	2	—	—	—	El interno es un orvino que está en asistencia.
»	Esfuerzos	1	—	4	—	3	2	—	—	—	Los tres internos son caminos, de los cuales dos están aún en asistencia y uno fué sacrificado.
»	Fracturas	1	—	—	—	—	1	—	—	—	
»	Afección muscular	1	—	—	—	—	1	—	—	—	
»	Elefantiasis.	1	—	—	—	—	1	—	—	—	
»	Formas coronarias	4	—	—	—	—	4	—	—	—	
»	Gabarro cutáneo.	1	—	—	—	—	1	—	—	—	
»	Abcesos frios.	1	—	—	—	—	1	—	—	—	
»	Putrefacción de la ramilla.	1	—	—	—	—	1	—	—	—	
»	Artritis	1	—	—	—	1	—	1	—	—	
»	Papilomas	—	—	1	Ovino 1	1	—	1	—	—	Está en asistencia.
»	Hernia inguinal	—	—	—	—	1	—	—	—	—	El interno está en asistencia.
»	Parafimosis.	2	—	—	Ave 1	1	1	—	—	—	
»	Keratitís.	—	—	1	—	1	—	—	—	—	
»	Castración	—	—	—	—	1	1	—	—	—	Está en asistencia.
»	Encastilladura.	2	—	—	—	1	1	1	—	—	
	Total	73	8	18	5	44	60	18	—	6	