

## DE NUESTRA CLÍNICA

**Parto distócico en una vaca**

Se trata de una vaca Durham de 4 años de edad, la cual, según su propietario, hacía 8 días que había empezado á hacer esfuerzos expulsivos, habiendo sido inútiles algunas tentativas de extracción forzada que se habían realizado.

Al examen constatamos el feto en avanzado estado de descomposición, voluminoso por el enfisema, con presentación anterior, posición dorso-iliaca izquierda; la cabeza, el cuello y los miembros anteriores en la cavidad pelviana, estos últimos flexionados en la articulación húmero-radio cubital.

La distocia era debida á la posición del feto y especialmente á la flexión de los miembros en un animal de bacinete muy estrecho. Estas dificultades estaban agravadas por el aumento de volumen debido al enfisema de la putrefacción.

Siendo muy dificultosas las manipulaciones debido á la gran inflamación de la vajina, resolvimos primeramente hacer la desarticulación de la cabeza para lo cual, después de haber fijado un lazo en el cuello y un par de ganchos en las órbitas, aproximamos la cabeza á la vulva y efectuamos la operación con un bisturí abotonado; una vez realizado esto, y después de haber fijado los miembros anteriores por medio de lazos, efectuamos la propulsión, llevando el feto todo lo más atrás posible. Enseguida, tirando de los miembros anteriores enlazados y ayudando con las dos manos introducidas en el útero, cambiamos la posición del feto, trayéndolo á la entrada de la pelvis en posición dorso-sacra. Enérgicas tracciones de los lazos del cuello y miembros, hicieron aparecer aquel, y parte del torax, fuera de la vulva, procediendo entonces á la evisceración y volviendo á las tracciones. Pero debido á la putrefacción avanzada del feto se cortó en las primeras vértebras lumbares, quedando el tren posterior dentro del útero, lo que nos obligó á fijar nuevos lazos apoyados en el sacro, para extraerlo. Una vez realizado esto y después de sacar la mayor parte de las envolturas desprendidas,

---

hicimos una prolija desinfección. Durante los días subsiguientes se notó un poco de fiebre debido á una metritis. benigna pero pronto pudo darse de alta á la enferma perfectamente curada.

ARTURO INCHÁURREGUI.

---

### MOVIMIENTO DE CLÍNICA

---

A continuación van los cuadros correspondientes al movimiento habido en las Clínicas de la Escuela durante el mes de Noviembre ppdo.:



MES	ENFERMEDADES	ESPECIES				CLÍNICA		RESULTADOS			OBSERVACIONES
		Equina	Bovina	Canina	Diversas	Interna	Externa	Curados	Mejorados	Muertos	
Nov'bre	Suma anterior.	66	2	8	2	23	55	11	—	1	Está en asistencia.
»	Otitis . . . . .	—	—	1	—	1	2	—	—	—	
»	Keratitis . . . . .	2	—	—	—	—	1	—	—	—	
»	Conjuntivitis . . . . .	1	—	—	—	—	1	—	—	—	
»	Linfangitis . . . . .	1	—	—	—	—	1	—	—	—	
»	Bronquitis . . . . .	2	—	—	—	1	2	1	—	—	
»	Neumonía . . . . .	1	—	—	—	1	—	—	—	—	
»	Pleuresia . . . . .	1	—	—	—	1	—	—	—	—	
»	Pleuro-neumonía . . . . .	1	—	—	—	1	—	—	—	—	
»	Enfisema pulmonar . . . . .	2	—	—	—	2	2	—	—	—	
»	Bronco-neumonía . . . . .	2	—	—	—	2	2	—	—	—	
»	Palatitis . . . . .	1	—	—	—	—	1	—	—	—	
»	Faringitis . . . . .	2	—	—	—	—	2	—	—	—	
»	Infección intestinal . . . . .	1	—	1	—	—	2	—	—	—	
»	Gastro-enteritis . . . . .	—	—	3	Felino 1	4	2	3	—	1	
»	Indigestión del librillo . . . . .	—	1	—	—	1	1	1	—	—	
»	Timpanismo . . . . .	—	2	—	—	1	1	1	—	—	
»	Fiebre tifoide . . . . .	1	—	—	—	1	1	1	—	—	
»	Anasarque . . . . .	5	—	—	—	4	1	2	—	—	
»	Difteria . . . . .	—	—	—	Ave 1	1	—	1	—	—	
»	Rabia . . . . .	—	—	1	—	1	—	—	—	1	
»	Cestitis . . . . .	2	—	—	—	—	—	—	—	—	
»	Reblandimiento cerebral . . . . .	1	—	—	—	1	—	—	—	1	
»	Total . . . . .	92	5	14	4	40	75	21	—	4	

Dos están en asistencia.