

es otro que ese; para estos casos el mejor tratamiento es secar el sudor con un trapo y luego pasarle otro mojado para refrescarlo, ó bien en caso que se prefiera mojarlos, se deberá usar agua mas bien tibia que fría y luego frotarlos vigorosamente. De esta manera se logra el mismo resultado, esto es, refrescarlos y lavarlos y no se les expone á enfriamientos bruscos y prolongados por la evaporación del agua, que luego son el origen de enfermedades del aparato respiratorio; por idéntico motivo no se soltarán los animales sudados, en el verano ni tampoco en el invierno aunque por otra causa, que es la siguiente: el pelo del animal constituye para su posesor un abrigo bien eficaz, pero á condición de que esté bien seco; estando mojado en vez de proteger el calor del cuerpo, favorece su pérdida; prácticamente se puede comprobar este aserto, basta observar que las grandes mortandades del invierno se suceden en épocas de temporales y nunca con tiempo seco por mas frio que haga.

(*Continuara*).

DE NUESTRA CLÍNICA

Un caso de pericarditis traumática

Trátase de una vaca lechera mestiza, de 5 á 6 años de edad, en buen estado de nutrición, ingresada en Clínica á mediados de Diciembre ppdo por trastornos del aparato digestivo y cuyos antecedentes anamnésicos son excelentes, informando el propietario que solamente desde pocos días el animal había acusado un brusco y profundo cambio de salud. Examinado y puesto en observación el sujeto, constatamos el siguiente síndrome fenomológico: decaimiento general, temperatura que oscila entre 39°5 y 40°5, boca seca y patinosa, abolición casi completa de la rumiación, cólicos periódicos, eructaciones fétidas, meteo-

rismo recurrente, excrementos diarreicos mucosos muy abundantes.

Entre los datos tenemos que el animal, perteneciente á una lechería pública (tambo), había sido sometido á la prueba oficial de la tuberculina con resultado negativo. También nosotros á título experimental procedimos á la cuti-y oftalmo-reacción con idénticos resultados, sin poder repetir la prueba hipodérmica en vista de la temperatura anormal.

Por la sintomatología mencionada cabía el diagnóstico de gastro-enteritis catarral aguda y por tal se trató.

A los 12 días la vaca sale de nuestra Clínica, habiéndose restablecido casi normalmente todas las funciones orgánicas constatándose solo alguna irregularidad en el apetito, algún síntoma de postración y enflaquecimiento pronunciado.

Transcurridos 10 días ingresa nuevamente en Clínica de urgencia nuestra *curada* por los fenómenos alarmantes y repentinos que han impresionado al propietario y que tomados en consideración se pueden resumir así: disnea muy intensa, excitación general, extremidades anteriores divaricadas y frías, cuello extendido y elevado, las yugulares muy voluminosas, la región intermaxilar y esternal edematosas, eructaciones gástricas continuas; comprimiendo el cartílago xifoide se provoca dolor intenso y quejido profundo (fenómeno observado por LEBLANCHE); estirando la piel de la cruz, del dorso y de los costados se reproduce el lamento angustioso del enfermo, los globos oculares sobresalen de las cavidades orbitarias presentándose la mucosa conjuntiva muy congestionada; la temperatura ahora ha subido á 41°8 y se notan horripilaciones muy seguidas. Este es el conjunto de un rápido examen sin los recursos de la semiótica, y que nos hace establecer sin titubaciones el diagnóstico de *pericarditis traumática*.

En las sesenta horas de hospedaje del enfermo, y que preceden la muerte, se presente á nuestra observación el siguiente cuadro clínico por el cual no cabe duda alguna sobre la naturaleza de la entidad morbosa que confirmó el diagnóstico formulado.

La locomoción que se cumple lentamente, es incoordinada y dolorosa especialmente cuando se hace dar vuelta al animal

sobre el lado izquierdo; hay anorexia absoluta, diarrea profusa colicuativa, tos frecuente y gemebunda, el animal cae al suelo repentinamente con síntomas de síncope, (este fenómeno se repite tres veces en las sesenta horas) y rechaza todo alimento y bebida; temperatura 42°, con pulso venoso. La percusión y la auscultación respectivamente demuestran un enorme aumento de la zona de matitez cardíaca; los ruidos cardíacos son apagados y casi inapercibidos; típico y sin recurso de fonendoscopio el sonido de *glu glu*. En uno de los síncope mencionados el animal muere.

Procedimos á la autopsia rapidamente.

Todas las notas anátomo-patológicas observadas nos enteran de una gravísima septicemia, aparte de las lesiones características de la pericarditis.

Abiertas las cavidades abdominal y toraxica encontramos en la primera una peritonitis sero-fibrinosa (12 á 15 litros de exudado) con las alteraciones concomitantes y características de los órganos contenidos en esta cavidad. En la parte diafragmática del rúmen que se adhiere al mismo diafragma por medio de un plastron fibroso en correspondencia con la mucosa interna del rumen, hallamos á continuación de dicho plastron un tejido cicatricial muy duro que cruje al corte, del tamaño de una moneda de un peso (cinco francos) que interesa toda la pared gástrica y que se prolonga exteriormente partiendo del plastron mencionado con un cordón fibroso del grosor del pulgar, cuyo trayecto en forma canaliculada llega hasta el pericardio. Aquí, rodeado de un tejido compacto y entre un líquido sañoso, se halla un trozo de alambre muy retorcido con una sola extremidad derecha, de 25 ctms mas ó menos de largo y del espesor de una aguja de hacer calceta. Este cuerpo extraño es el causante de una pericarditis icorosa fibrino-purulenta acompañada de neumo-pericarditis. La cavidad pericardia contiene cerca de 3000 gramos de pus espeso y verdoso y la superficie externa del miocardio está cubierta especialmente en la parte derecha de vellosidades fibrino-plásticas también verdosas.

DIEGO BLASI.

Movimiento de Clínicas durante el mes de Enero de 1911

MES	ENFERMEDADES	ESPECIES						CLÍNICA RESULTADOS					OBSERVACIONES	
		Equina	Bovina	Canina	Diversas	Interna	Externa	Cirados	Mejorados	Muertos				
Enero	Heridas	5	1	1	—	5	2	—	—	—	—	—	—	Los tres internos estan en asistencia
»	Fracturas	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	El interno, que es un caballo, está en asistencia.
»	Exostosis	9	—	—	—	4	5	1	—	—	—	—	—	Tres estan en asistencia.
»	Formas coronarias	2	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
»	Caries óseas	1	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	El interno es un equino.
»	Contusion de la suela	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
»	Afección navicular	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
»	Esfuerzos	7	—	1	—	2	6	2	—	—	—	—	—	El interno está en asistencia.
»	Sinovitis	4	—	—	—	1	5	—	—	—	—	—	—	—
»	Teno-sinovitis.	2	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
»	Tenosis	5	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—
»	Artritis	3	—	—	1	5	1	—	—	—	—	—	—	Los tres internos estan en asistencia.
»	Luxación de la columna vertebral	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
»	Infosura	5	—	—	—	2	1	1	—	—	—	—	—	Uno está en asistencia.
»	Botriomicosis	4	—	—	—	1	5	—	—	—	—	—	—	El interno está en asistencia.
»	Parálisis del super-escapular	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
»	Higromas	5	—	—	—	1	2	1	—	—	—	—	—	—
»	Linfagitis	5	—	—	—	2	5	1	—	—	—	—	—	Uno está en asistencia.
»	Hematoma	1	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
»	Prolapso del globo ocular	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
»	Keratitis	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
»	Estomatitis	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Transporte	54	1	6	—	5	25	41	11	—	—	—	—	—

MES	ENFERMEDADES	ESPECIES				CLÍNICA		RESULTADOS			OBSERVACIONES
		Equina	Bovina	Canina	Diversas	Interna	Externa	Curados	Mejorados	Muertos	
Enero	Suma anterior . . .	54	1	6	5	25	41	11	—	—	
»	Faringitis . . .	1	—	—	—	1	1	1	—	—	
»	Coriza contagiosa . . .	—	—	Ave	1	—	1	—	—	—	
»	Gastritis. . .	1	2	3	—	3	3	3	—	—	
»	Gastro-enteritis . . .	1	1	1	—	1	1	1	—	—	
»	Enteritis. . .	1	—	—	—	—	1	—	—	—	
»	Pasteurellosis canina . . .	—	1	—	—	1	—	—	—	1	
»	Pasteurellosis bovina . . .	—	1	—	—	1	1	1	—	1	
»	Anasarque . . .	5	—	—	—	2	1	1	—	—	
»	Tuberculosi . . .	—	—	1	Ave	—	—	—	—	—	
»	Cistitis . . .	—	—	1	Felino	1	—	1	—	—	
»	Difteria . . .	—	—	—	—	—	1	—	—	—	
»	Pericarditis traumática. . .	—	1	—	Ave	1	—	—	—	—	
»	Eczema cutaneo. . .	—	1	1	—	1	—	1	—	—	
»	Intoxicación . . .	1	—	—	—	1	—	—	—	—	
»	Urticana. . .	1	—	—	—	—	1	—	—	—	
»	Bronquitis . . .	1	—	—	—	—	1	—	—	—	
»	Enfisema pulmonar. . .	1	—	—	—	—	1	—	—	—	
»	Pleuro-neumonia. . .	1	—	—	—	—	1	—	—	—	
»	Bronco-neumonia . . .	—	1	—	—	—	1	—	—	—	
	Total . . .	66	5	15	9	42	53	19	—	5	

El felino fué sacrificado y el ave está en asistencia.

Está en asistencia.

Está en asistencia.