

creen haber sido la parte central del Asia, pero bien pudiera haber sido la América, dado la abundancia de fósiles en todas las capas de estas tierras, compatibles con la vida de esos animales. Esta opinión puede reafirmarse aún más si tomamos en cuenta el célebre descubrimiento de Wartman, quien reconstruyó con restos sacados en tierras de América al Phenacodus, que es considerado desde entonces como el preequino más antiguo que se conoce, más aún que el Hyracotherium de Europa, el que ha quedado desde entonces como una forma de transición.

Para no extendernos más sobre este punto, podemos aceptar como cierto, por todos los datos que hemos ya comentado, la existencia real de los preequinos en las capas de formación del suelo de América y en gran número de formas, desde las más profundas del terciario compatibles con la vida de estos mamíferos, hasta las más superficiales de la cuaternaria.

(Continuará.)



## Notas de la práctica

### FRACTURA DEL MAXILAR EN UN CANINO

Por el Dr. ENRIQUE G. VOLGESANG

Raras son las descripciones de fracturas del maxilar inferior en los caninos. Como causas predisponentes se atribuyen los estados patológicos del hueso (osteítis fibrosa, osteomyelitis, etc.). Los síntomas principales son la gran salivación y la supresión de los deseos de comer.

A la clínica se trajo un canino, de raza Pomerania, de 3 años de edad, con gran salivación y parálisis del maxilar que hizo pensar en seguida en un síntoma de Rabia. Según anamnesis, el canino en cuestión había salido a la calle y volvió con los síntomas antes descriptos. Al revisarlo con detalle, noté que era una fractura de la rama derecha del maxilar inferior, más o menos en su mitad.

El tratamiento consistió en la unión de la fractura mediante alambre que pasé entre dos molares, haciéndolo en una forma de ocho. Para ello tuve que efectuar una narcosis que la hice a base de inyección subcutánea de cocaína y novocaína.

El alimento le fué suministrado durante quince días en forma líquida.

Se recomienda especialmente para caninos no dóciles el uso de vendaje entre los dos maxilares.