

PECUERIAS URUGUAYAS

CARACTERISTICAS DE ESPECIES COMERCIALES

Morales, E. - Bertullo E.

NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO	TAMANO INDIVIDUAL (EN GRAMOS)	CONTENIDO GRASO DE LA CARNE	CAPTURA POTENCIAL TON/ANO	ESTACION DE CAPTURA
MERLUZA	<u>Merluccius</u> <u>bulbus</u>	350-2000	0.5-3.5%	100.000	O.I.V.
CORVINA	<u>Microgobius</u> <u>furcatus</u>	250- 2500	0.8-2.0%	25.000	TODO EL AÑO
PESCADILLA	<u>Chirocentrus</u> <u>striatus</u>	250- 1800	1.0-3.0%	15.000	TODO EL AÑO
CALAMAR	<u>Loligo</u> <u>argentinus</u>	200- 1000	0.5-1.0%	30.000	O.I.V.
RUBIO	<u>Helicolenus</u> <u>dactylopterus</u>	80- 110	2.0-3.5%	50.000	TODO EL AÑO
ANCHOITA	<u>Engraulis</u> <u>anchetta</u>	15- 100	5.0-15%	50.000	O.I.V.
CANGREJO ROJO	<u>Grapsus</u> <u>quinguelans</u>	400- 900	0.5-2.0%	10.000	TODO EL AÑO
PARGO ROSADO	<u>Pagrus</u> <u>serpens</u>	250- 1500	1.0-4.0%	10.000	V.P.
BONITO	<u>Sarda</u> <u>sarda</u>	500- 10.000	12-15%	5.000	P.O.
BROTOLA DE ALTURA	<u>Urophycis</u> <u>circumata</u>	350- 200	1.0-3.0%	5.000	O.I.P.

CASTAÑETA	<u>Cheilodactylus</u> <u>bulgii</u>	200- 3500	3.0-5.0%	40.000	TODO EL AÑO
PALOMEYA	<u>Paromna</u> <u>sigata</u>	300- 1000	8.0-15%	5.000	TODO EL AÑO
PARGO BLANCO	<u>Umbrina</u> <u>canosai</u>	200- 800	1.5-4.0%	5.000	TODO EL AÑO
RAYAS	<u>Rajidae spp.</u>	400- 5000	1.0-2.0%	20.000	TODO EL AÑO
PEZ LIMON	<u>Seriola</u> <u>lalandei</u>	1000- 4000	12-15%	5.000	O.V.
SABALO	<u>Prochilodus</u> <u>platensis</u>	500- 2000	5-10%	1.500	TODO EL AÑO
GALLUDO	<u>Squalus</u> <u>acanthias</u>	500- 2000	1-5%	12.000	TODO EL AÑO
CAZON	<u>Galheorrinus</u> <u>vitaminicus</u>	800- 4000	1-4%	2.500	O.P.
LENGUADO	<u>Paralichtys</u> <u>spp.</u>	500- 3000	1-3%	2.000	TODO EL AÑO
MERO	<u>Acanthistius</u> <u>brasiliensis</u>	400- 2000	2-5%	2.000	TODO EL AÑO
CABALLA	<u>Scomber</u> <u>japonicus</u>	300- 2000	3-8%	2.000	V.O.
ATUN	<u>Tunidae spp.</u>	10000 up	5-12% *	10.000	P.V.G.

Fuente: Instituto Nacional de Pesca (M.G.A.P.)
Instituto de Investigaciones Pesqueras (U. de la Rpa.)
F.A.O.

*DATOS ESTIMADOS.