

Hospitalizaciones por infecciones respiratorias por Virus Sincicial Respiratorio en lactantes menores de 6 meses.

CASMU, Montevideo, Uruguay, 2013 - 2023.



METODOLOGÍA



- Estudio observacional retrospectivo.
- Revisión de historias clínicas.
- Muestra de 159 pacientes con aspirado nasofaríngeo positivo para VRS.
- Análisis de características epidemiológicas, antecedentes personales, necesidad de oxigenoterapia, complicaciones y evolución.



RESULTADOS



- VRS responsable de la mayoría de las IRAB
- Predominio de sexo masculino (54,7%).
- 39 (35,2%) pacientes con infección grave.
- La técnica de oxigenación/ventilación más utilizada fue la cánula nasal.
- 56 (24,5%) pacientes con hiperreactividad bronquial.
- Un paciente (0,006%) con oxígeno dependencia.



DISCUSIÓN



- Factores de riesgo: sexo masculino, prematurez, enfermedades previas (consistente con bibliografía previa).
- Vínculo estadísticamente significativo entre prematurez, prematurez severa e infección grave.



IMPORTANCIA DEL ESTUDIO

Escasez de trabajos previos en nuestro medio que analicen poblaciones similares.
Implementación de nuevas medidas de prevención en embarazadas en nuestro país.



AUTORES

Br. Benítez Yejas Florencia
Br. Duarte Pritsch Camila
Br. Garay Ruíz Joaquín Nicolás
Br. Garibotti Sierig Bruno Gastón
Br. Garibotti Sierig Cristhian Nicolás
Br. Hansen Pais Micaela
Dra. Machado Karina / Dra. Assandri Elizabeth

