Tribunal Del Castillo. - Aprobado: 29/1111/61
Rovina.

INFORME

PRACTICA 50. ANO

Raúl Fijuán Bazet Agosto, 1961 Facultad de Agronomía

Montevide



INDICE

la. Farte. - SILVICULTURA. -

| cap. | I Introducciónpg. | 1 |
|------|--|------------|
| Cap. | II Mercado de madera y subproductospg. | 10 |
| Cap. | III Viveros forestalespg. | 17 |
| Cap. | IV Estudio de una explotación forestalpg. | 28 |
| Cap. | V Inventarios forestalespg. | 56 |
| Cap. | VI Hanejo de montespg. | 70 |
| Cap. | VIIConsideraciones generales sobre un Plan | |
| | Director de forestaciónpg. | 76 |
| Cap. | VIII Ensayo con herbicida-fungicida V.F.Mpg. | 84 |
| | Farte CVINOTECNIA | |
| Cap. | I Selección de majadas generales en la zona | |
| | del Este de mostro País. | 99 |

I PARTE

SILVICULTURA

1) INTECDUCCION:

Muestro país, como es de conocimiento general, sopor ta una aguda crisis maderera desde hace muchos años, debido a la explotación incontrolada de su patrimonio forestal y a la falta de una legislación apropiada que regule esa explotación y fomente la implantación de nuevas áreas forestadas. Se estima que un 3% de la superficie nacional se encuentra cubierta de bosques y que en tiem pos de la Colonización ese índice era de aproximadamente un 17%.-

Existe un proyecto de Ley forestal que está actualmente a estudio de la Comisión de Fomento del Senado. De promulgar
se esta Ley se daría estímulo para la creación de una gran riqueza
forestal cuyas derivaciones fundamentales serían el ahorro de divi
sas que actualmente gravan penosamente nuestra economía así también
como la creación de nuevas industrias derivadas de la madera que
insumirían una buena cantidad de mano de obra rural y urbana.-

A lo largo de las rutas nacionales, desde el Río de la Plata al Río Cuareim, y del Río Uruguay a la laguna Merim, el panorama de nuestro país da lugar a serias reflexiones en cuanto al encausamiento de su actual política de repoblación forestal. Una campaña explotada en forma por demás extensiva, en base a una in dustria como la ganadería, que si bien es a no dudarlo la más conveniente para un territorio de las condiciones agrológicas del nues tro, ha sido, debido a la deficiente técnica utilizada, el factor causante en primer orden, del estado actual de muchos suelos que se encuentran totalmente degradados.—

Desde la época de la Conquista, pasando a través del período de las justas independentistas, hasta se puede decir unos veinte años atrás, constituyó la tierra un elemento de aprovechamien

to del criollo, algo de donde se extraía su sustento y a lo que no se le devolvía absolutamente nada. No ha sido durante un día, ni durante un año, sino a través de mucho tiempo que nuestro suelo se ha ido desgastando, erosionándose, pasando a través de las distintas etapas de degradación, perdiendo sus pasturas de alto valor fo rrajero para sustituírlas por otras de escaso valor, hasta llegar en muchos casos a las formas de desertización total.-

Es entonces, que, si no se ha sabido mantener estos campos en base a una saneada política agronómica, es tiempo ya de iniciar los estudios de recuperación de las denominadas zonas de - gradadas, que constituyen actualmente excelentes sitios forestales, mediante el empleo de adecuadas técnicas para su total arborización A los efectos de dar una idea acabada sobre los beneficios que rebundan para el país mediante la implantación de bosques llevada a cabo por un programa racional de forestación nacional, es muy interesante transcribir el artículo 4°. del Proyecto de Ley Forestal, realizado por los Ings. Lafitte, Voulminot, Fynn et al. y que actualmente costituye el más cercano esfuerzo en procura de la obtención de una necesitada legislación forestal.

Art. 4°..- Son bosques protectores los que ocupen los terrenos declarados de necesidad forestal y que, por su finalidad principal, sirvan para uno o varios de los siguientes fines:

a) La

protección del suelo de una zona determinada, o de costas marítimas, riberas fluviales, orillas de lagos, lagunas o islas;

b) la

prevención o detención de erosiones;

fijación de médanos y dunas y

d) la

protección y regularización del régimen de las aguas de cuencas de interés público, y evitar los perjuicios de las inundaciones.-

Por el artículo 7°. se declaran "terrenos de necesidad forestal, aquellos que por sus características fisiográficas ; se considere que deban estar ocupados por un bosque protector"-

En el art. 17°. del Cap. de Defensa Forestal, "queda prohibida la devastación y destrucción de los bosques protectores por medio de cualquier operación que atente contra su desarrollo y permanencia. El Consejo Forestal será el encargado de determinar las talas de aprovechamiento respectivas."

Mediante esta Ley Forestal entonces, se pretende encausar a nuestro medio rural hacia la obtención, el cuidado e in cremento del acervo de bosques, para lograr que estos sean fuente de riqueza nacional.-

En parte también podría evitarse la migración del cam po a la ciudad que actualmente alcanza la cifra del 1,5 %, lo que es bastante elevado.-

Muestro país se abastece hasta el presente de madera y demás productos forestales, mediante la importación de los mis - mos desde países en los cuales el crecimiento de los bosques no es superior al nuestro.-

Los expertos de F.A.O. y de otras organizaciones in ternacionales que han visitado nuestro país han quedado en verdad
sorprendidos de que el Uruguay sea practicamente una estepa gramí-

nea despoblada de bosques con grandes zonas de sitios forestales .-

Estos técnicos han destacado que no existe razón por la cual nuestro país no pudiera abastecerse a si mismo com madera y otros productos forestales dentro de un período de 30 a 40 años, mediante la elección de las especies apropiadas a cada región.-

La explotación de nuestro bosque indígena y de los escasos montes artificiales existentes ha sido dirigida en el pasa do principalmente con el solo objeto de extraer leña y carbón vege tal, pero el interés por estos productos ha ido disminuyendo por ser muy cara su elaboración y transporte y no poder competir con los productos derivados del petróleo, que posee mayor poder calorífico, ocupa menos espacio, y su importación se ha visto favorecida hasta hace poco tiempo por un tipo de cambio preferencial.—

Algunas instituciones privadas, en vista de la dificultad de obtener algunos productos forestales, han tratado de obtener un sustituto de la madera para la obtención de celulosa médiante la utilización de otras materias primas como la paja de trigo y el bagazo de la caña de azúcar.

Creemos no obtante, que estos productos aún siendo ú tiles en estos momentos debido a la escasez de madera no pueden ser competitivos por dar muy poco rendimiento en relación a su gran vo lumen y a los costos de flete hasta el lugar de elaboración.-

Según estadísticas de la F.A.O. nuestro país, Uruguay, tenía en el año 1956 una superficie de tierras cubiertas de bosques, naturales y artificiales de 554.000 Hás., frente a una superficie total utilizable de 16.206.000 Hás.

Esta área cubierta de bosques constituye el 0,058% del área total boscosa de Sud América (956.660.000 Hás. de bosques), el 0,031% de las tres Américas, Sud, Centro y Norte (1.754.170.000 Hás. cubiertas de árboles), y el 0,012% de la superficie boscosa mundial, que se calcula sea de 4.404.900.000 Hás.

| País | Areas boscos | Areas boscosas | | <u>ab</u> |
|-------------|--------------|----------------|-------------|-----------|
| Argelia | 3.070.000 | Hás. | 235.104.000 | Hás. |
| Argentina | 70.000.000 | ŧŧ | 204.821.000 | 78 |
| Australis | 48.381.000 | 29 | 722.035.000 | π |
| Bélgica | 601.000 | \$1 | 2.423.000 | 17 |
| Bolivia | 47.000.000 | 18 | 62.858.000 | 转 |
| Brasil | 561.656.000 | 69 | 285.332.000 | 17 |
| Canadá | 417.674.000 | 11 | 504.456.000 | # |
| Colombia | 69.400.000 | tŧ | 39.000.000 | 43 |
| Congo Belga | 129.141.000 | 17 | 97.618.000 | st |
| Costa Rica | 3.617.000 | 11 | 1.403.000 | ** |
| Chile | 20.443.000 | 13 | 52.934.000 | H |
| Ecuador | 14.845.000 | 11 | 30.034.000 | • |
| E.E.U.U. | 315.795.000 | tt | 602.593.000 | n |
| España | 15.860.000 | ŧŧ | 33.988.000 | |
| Francia | 11.608.000 | Ħ· | 43.442.000 | n |
| India | 78.752.000 | £\$ | 253.535.000 | ** |
| | | | | |

| País | Areas boscosas | | Areas no boscos | 38 5 |
|----------------|----------------|------|-----------------|-------------|
| Inglaterra | 1.623.000 | Hés. | 21.121.000 | iias. |
| Irán | 3.000.000 | • | 160.000 .000 | n |
| Israel | 54.000 | 77 | 1.970.000 | Ħ |
| Italia | 5.781.000 | Ħ | 23.618.000 | π |
| Méjico | 38.836.000 | 17 | 158.091.000 | :11 |
| Noruega | 7.500.000 | # | 23.300.000 | 11 |
| Nueva Zelandia | 6.231.000 | Ħ | 20.359.000 | 11 |
| Panamá | 5.270.000 | 17 | 2.177.000 | Ħ |
| Paraguay | 20.906.000 | Ħ | 17.809.000 | π |
| Perú | 70.000.000 | Ħ | 54.457.000 | 97 |
| Polonia | 7.467.000 | Ħ | 23.014.000 | 11 |
| U.R.S.S. | 1.131.116.000 | 17 | 1.102.654.000 | A |
| URUGUAY | 554.000 | · 17 | 16.206.000 | T 1 |
| Venezuela | 45.000.000 | 11 | 46.205.000 | t1 |

Como puede apreciarse en el cuadro que antecede el Uru - guay arroja una superficie cubierta de bosques que constituye apenas un 3,3% del total del área aprovechable, mientras que países como Estados Unidos tienen un 34,5% de su superficie laborable cubierta de bosques.-

De la superficie que actualmente tiene forestada el Uru guay, corresponde el 80% de su total a los montes indígenes, de gran valor consecuencia como reguladores de inundaciones, protecto res de las cuencas, etc. pero de escaso o nulo valor maderero, pues en su mayor parte se destina su madera a la obtención de leña y de carbón de leña.

De este monte indigena, que cubre actualmente algunos

ditios forestales de interés, como las serranías y también y especialmente las cuencas de los ríos y arroyos donde se forma el bosque de "galería", se destacan por su predominancia las siguientes especies:

Espinillo (Acacia farnesiana)

Coronilla (Scutia buxifolia)

Ceibo (Erytrhina crista-galli)

Sauce criollo (Salix humboldtiana)

Algarrobos (Prosopis sp.)

Tala (Celtis spinosa)

Molle (Schimus depedens)

Blanquillo (Sebastiana Klotzchiana)

Arrayán (Blepharocalix tweediei)

Curupí (Sapium sp.)

Mataojo (Pouteria salicifolia)

Guayabos (Eugenia sp.)

Canelón (Rapanea laetevirens)

Pitanga (Eugenia uniflora)

Randubay (Prosopis algarrobilla)

Viraró (Aupretschia salicifolia)

El otro 20% restante está constituído por macizos foresta les que han sido plantados en su mayor parte para protección (sombra y abrigo) de los ganados en los campos destinados a la ganadería extensiva. Son bosques predominantemente formados por distinatas especies de Eucalyptus, predominando en mayoría el E. globulus, luego el E. rostrata y el E. tereticornis.

Un interesante ejemplo de forestación nacional lo consti

tuyen los bosques de Pinus pinaster (marítimo) de nuestro litoral costero, franja que se extiende desde las cercanías de Montevideo hasta las inmediaciones del Cabo Polonio, en Dpto. de Rocha. Estas costas medanosas han sido fijadas con especies tales como Acacia trinervis, Tamarix sp. y luego plantadas con pinos marítimos.-

También se nota ahora un gran incremento en las fores taciones serranas en base de Eucaliptus sp. y pinus radiata, especialmente en los Dptos. de Lavalleja y Maldonado, así como también las plantaciones forestales en extensas zonas cercanas a la cuenca del Río Negro y a la zona de Areniscas de Tacuarembó.-

Aunque todavía se está muy lejos de un programa de forestación nacional integral, puede decirse que actualmente hay una inquietud favorable hacia el incremento de nuestro patrimonio made rero, como lo prueba, aunque sin llegar a ser algo muy efectivo, el actual subsidio otorgado a las plantaciones forestales.— (año1961). Por este subsidio se beneficiarán en \$250.00/Há. las plantaciones forestales que se efectúen dentro de planes racionales.—

No se pretende que en nuestro país alcance la indus tria de la madera un sitial de privilegio, que la transforme en la primera industria nacional. Se entiende que ese sitial debe estar ocupado por la industria de la ganadería semi-extensiva, pues toda vía y por muchos años felizmente dispondremos de enormes estepas de buenas pasturas forrajeras. Se pretende eso sí, llegar a forestar cerca de 1.000.000 de Hás. de sierras, 300.000 Hás. de bañados, y 60.000 Hás. de dunas, además de las cuencas hidrográficas y los terrenos que se hallan en un grado alto de degradación.

Se pretende también llegar a por lo menos el autoabas

tecimiento de productos forestales, cuya importación para el quinquenio de 1955-1959 alcanzó la cifra de U.S.D. \$87.308.290 dólares que equivalió a las exportaciones de carnes de ese quinquenio, que alcanzaron la suma de \$89.992.110 dólares. En los cuatro años comprendidos desde 1957 al 1960 las importaciones de productos del bos que alcanzaron la cifra de 62.488.334 dólares, como lo hacen constar las estadísticas que insertamos en la página siguiente.

11) Mercado de madera y subproductos:

Si examinamos nuestro balance Comercial en el último descenio, vemos que las importaciones generalmento superan ampliamente a las exportaciones. Es decir, que hay un proceso deficita — rio que se va acentuando en los últimos años evidenciando la necesidad de corregir un desajuste estructural de entidad.—

Según opinion de técnicos en la materia, ese desajus te deriva de dos factores negativos:

a) el estancamiento de muestra producción agropecuaria, que se está viendo cada vez más gravada por cargas impositivas, disminuyendo el atractivo de invertir en el negocio del campo nuevos capitales y b) la tendencia declinante que en el curso de los últimos eños ha venido caracterizando la curva de precios de nuestros principales renglones exportables en el mer cado internacional.

Las cifras sobre el particular, que detallamos a continuación, son elocuentes por sí solas, y ponen lo dicho de manifiesto:

| <u> </u> | EXPORTACIONES | IMPORTACIONES | SALDOS |
|----------|---------------|---------------|----------|
| 1951 | 236.329 | 309.383 | - 73.054 |
| 1952 | 208.889 | 236,227 | - 27.338 |
| 1953 | 269.816 | 193.120 | + 76,696 |
| 1954 | 248.960 | 273.184 | - 24.224 |
| 1955 | 183.674 | 225.045 | - 41.371 |
| 1956 | 211.054 | 205.793 | + 5.261 |
| 1957 | 128.248 | 225.442 | - 98.194 |

| <u>~</u> | EXPORTACIONES | INPORTACIONES | SALDOS |
|----------|---------------|----------------|----------|
| 1958 | 138.622 | 134.649 | + 3.973 |
| 1959 | 97.798 | 213.959 | -116.161 |
| 1960 | 129.401 | 242.816 | -113.415 |

Nota: Las centidades estan expresadas en miles de dólares.-

Como es sabido, las importaciones correspondientes al año 1960 fueron realizadas al amparo de dos regimenes legales, con intervención concomitante de dos organismos oficiales. Por intermedio del Contralor de Exportaciones e Importaciones se autorizaron despachos por un valor de U\$S 128.042.572.00 y por medio del Banco República por un valor de U\$S 114.773.741.00.- Sumados ambos güaris mos nos da un valor total de U\$S 242.816.313.00.-

En cuanto a la importación de madera en sus diversos tipos y productos derivados de la explotación forestal, detallamos a continuación las importaciones realizadas en los últimos 4 años de los principales rubros:

| | <u> 1957</u> | 1958 | 1959 | 1960 |
|-------------------------|--------------|---------|---------|-------------------------------|
| Madera en delos o | | | | |
| vigas labradas | 271.085 | 278.527 | 547.287 | 553.776 |
| Madera dura en rollo o | | | | |
| vigas labradas | 454.906 | 661.565 | 351.431 | 427.146 |
| Madera compensada y/o | | | | |
| terciada | 15.177 | 7.478 | 3.561 | 12.457 |
| Madera pino spruce | 334.662 | ****** | | war and our seas right fills. |
| Madera roble | 56.401 | 27.235 | 21.630 | 91.874 |
| Madera en chapa excepto | | | | |
| compensada y/o terciada | 238.956 | 91.107 | 49.001 | 160.711 |

| ARO-RUPRO | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | | |
|--------------------------|--------------------------|----------|-------------|---------------------------|--|--|
| Madera Pino Bresi | 1 | | | | | |
| en rollo o cantea | da | | | | | |
| y aserrada y de m | ล็ย | | | | | |
| de 25 mm.inclusiv | e 4.784.94 | 4/4.347. | 127/3.185.8 | 352/3.828.758.00 | | |
| Madera Pino tea | | | | | | |
| Madera Pino Brasil | 1 | | | | | |
| excepto la mencion | n. 4.732 | | 62.844 | | | |
| Madera de postes | | | | | | |
| y piques tutores | 678.419 | 235.740 | 174.976 | 346.892 | | |
| Maderas semi-dura | s | | | | | |
| en rollos y vigas | | | | | | |
| labrades | 888.734 | 78.110 | 381.382 | 603.121 | | |
| Mederas no especi- | - | | | | | |
| ficadas | 124.363 | 20.923 | 56.118 | 27.855 | | |
| Papel para empape: | la r 30.849 | 1.135 | 9.214 | 17.330 | | |
| Cartones matrices | 15.831 | 10.720 | 14.197 | 23.801 | | |
| Colulosa al sulfa- | | | | | | |
| to blanqueada | 231.844 | 57.684 | 392.348 | 581.587 | | |
| Celulosa al sulfa- | | | | | | |
| to cruda | 990.093 | 444.126 | 467.¥29 | 792.572 | | |
| Celulosa al sulfi- | | | | | | |
| to blanqueada 1. | 279.051 | 831,950 | 1.230.489 | 1.086.779 | | |
| Celulosa al sulfi- | - | | | | | |
| to cruda | 953.029 | 256.860 | | | | |
| Celvloide | 31.405 | 9.962 | | | | |
| Celulosa sin espe | | 403.368 | 452.786 | 794.185 | | |
| Corcho natural en | _ | | | | | |
| chapas, hojas o láminas, | | | | | | |
| aglomerado en plan | nchas, | | | | | |
| molido, triturado | • | | | 000 730 | | |
| otros tipos, | 356 . 90 3 | 253.353 | 302.125 | 220.713 | | |
| Extracto de que- | _ | | 00/ 000 | 204 006 | | |
| bracho tanolín, | 435.779 | 346.032 | 386.957 | 324 . 2 2 6 | | |
| Papel base para | | | | | | |

| sensibilizar des- | | | | |
|---|-------------------|------------|----------------|------------|
| tinado a la fabri- | | | | |
| cación de papel para | 10 310 | 9 105 | 12 072 | 12 600 |
| copias heiográficas | | | 13.972 | |
| Fapel celofán 36 | 00.220 | 150.105 | 268.030 | 280.224 |
| Papel para usos indus- triales no fabricable | | | | |
| _ | 10.357 | | 420 | 2.500 |
| Fapel para empresas | 10.001 | | 420 | 2.500 |
| periodisticas, 5.42 | 2 701 | 4 756 930 | 4.094 174 | 3 226 845 |
| Papel para cigarrillos | | | | |
| Carton para usos | 2100470 | 0,,000 | 170.07 | 211,000 |
| industriales | 20.151 | 6.832 | 6.565 | 9.726 |
| Separadores de madera | 200173 | 0.072 | 0.707 | 7.120 |
| para baterías, | 15.976 | 56.170 | 56, 562 | 24.699 |
| Carton fabricable | 17.710 | 704119 | 30.302 | W4 6 0 9 9 |
| en el país, | 4.184 | 540 | | 821 |
| Carton cromo, | 4.388 | | | · |
| tapel madera blanco, | | | 1.043 | |
| Carton paja, | 660 | 1 7 | 200.5 | 63 |
| Carton satinado, | | 934 | 3.021 | _ |
| Cartulinas otros tipos | | | - | |
| Cartulinas fibras, | 3.164 | 20,01 | | 1.420 |
| Cartulinas cromo, | 1,015 | | | 7.152 |
| Cartulinas duplex, | _ ~ > . | | | |
| carton forrade, | 5.629 | | | |
| Cartulina menila, | 4.671 | | | 14.137 |
| Cartulina oleada, | 500 | 56 | | |
| Cartulina opalina, | 4.047 | | | 936 |
| Cartulina helada y/o | | | | |
| mantillada o glaceada, | 9.378 | 371 | 267 | 640 |
| Papeles fabricables en | | | | |
| el país. | 16.502 | | | |
| Papel calco o fotocalco | o | | | |
| milimetrado, | 10.345 | 3.573 | 6 .8 88 | 8.999 |

| HUBROS | <u> 1957</u> | 1958 | 1959 | <u> 1960</u> |
|--------------------|-------------------|--------|--------|--------------|
| | | | | |
| Papel crepé y | | | | |
| acresponado, | 15.309 | 3.820 | | 13.804 |
| Papel cromo, | 213.691 | 23.013 | 39.600 | 48.071 |
| Papel diario, | 166.007 | 47.963 | 95.178 | 68,995 |
| lapel engomado | | | | |
| para imprenta, | 5.249 | 2.578 | 23.682 | 16.207 |
| Papel glacé para | | | | |
| cartón y glaceado, | 72.384 | 18.003 | 49.322 | 48.394 |
| Papel húmedo para | | | | |
| transportes, | 214 | | | 418 |
| Papel ilustración | 106.087 | 13.780 | 93.729 | 71.354 |
| Papel imitación cu | e ro 4.460 | | 250 | 143 |
| Papel imitación | | | | |
| gamza, | 2.948 | | | |
| Papel Kraftol, | 309 | | 850 | 314 |
| Papel metalizado | | | | |
| para dorar, | 150 | 105 | 268 | 551 |
| Papel manteca, | 9.691 | 3.644 | 10.025 | 5.698 |
| Papel para encuado | r- | | | |
| nación fantasía, | 15.335 | 500 | 3.771 | 12.153 |
| Papel para fichas | | | | |
| Rolerith y otras, | 46.976 | 24.479 | 60.273 | 59.481. |
| Tapel para platear | , | | | |
| doman y colorear, | 7.064 | | 1.477 | 3.341 |
| Papel para valores | 9.145 | | 21.287 | 8.520 |
| Papel para vidrio, | 2.682 | | | 2.288 |
| Papel imitación | | | | |
| pergamino, | 854 | | | |
| Papel imitación | | | | |
| pergamino, | 17.798 | 17.552 | | 8.974 |
| Papel secante de | | | | |
| la. calidad, | 6.778 | | | |
| Papel seda fantasi | a | | | |

| RUBROS | <u>1957</u> | <u>1958</u> | <u> 1959</u> | <u>1960</u> |
|--------------------------------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| y para copiadores Papel vellumoid | 7.574 | 1.404 | 12.054 | 16.781 |
| para juntas, Radera de durmiento | 6.139 | 522 | 4.927 | 19.921 |
| pura vías, | v 5 | | | 74.223 |

TOTAL: USS 19.891.647.00 13.601.777 13.688.992 15.305.918 Total rubros: 66 47 49 59

De lo expuesto se desprende que las cifras totales ale canzan niveles de gran importancia, significando para el año 1960 casi un 7 % del total de nuestras importaciones y que, salvo algunos altibajos, van en continuo aumento.

Tenemos la certeza, de que, dade el enorme territorio existente en el Uruguay apto para la forestación, si nuestro gobierno proticase una política forestal adecuada, muchos de los rubros mencionados anteriormente, podrían producirse en el país, con los beneficios consiguientes.

Según citras suministradas por el Contralor de Exp. y Importaciones y el banco de la República, los países que abastecen principalmente de estos productos al Uruguay son:

| PAISES | RUBE | ROS |
|-------------------------|--|-----------|
| | maderas(varios tipos) pa barraca y mat. de constr | |
| E.S.U.U. | 475.000 | 1.790.000 |
| Prasil | 4.005.700 | 495•000 |
| Cran Bretaña Francia | | 590.000 |

Chile

603.000

| PAISES | R | JBR OS |
|------------------|------------------|-------------------------|
| | Maderas (Varias) | Materias Primas(Varias) |
| Paragua y | 900.000 | |
| Finlandia | | 1.240.060 |
| Ghana | 263.000 | |
| Checoeslovaquia | | 432.000 |
| Canadá | 220.000 | |
| Suecia | 2.740.000 | |
| Suiza | 109.000 | |
| Yugoeslavia | 224.000 | 195.000 |
| | | |
| Maderas | Ms | aterias primas |
| | | |

| I) | Brasil | 1) | Suecia | |
|----|-------------|-----|-----------------|--|
| 2) | Faraguay | 2) | E.E.U.U. | |
| 3) | R. h. U.U. | 3> | Finlandia | |
| 4) | Yugoeslavia | 4) | Chile | |
| 5) | Ghana | 5) | Francia | |
| | | 6) | Gran Bretala | |
| | | 7) | Checoeslovaquia | |
| | | 8) | Candá | |
| | | 9) | Yugoeslavia | |
| | | 10) | Suiza | |
| | | | | |

Pebemos hacer kincapie, por considerarlo de importancia, en el hecho de que muchas de las esencias forestales que proporcionan los productos mencionados, si bien algunas de ellas no pueden aclimatarse a nuestro faís, pueden sustituirse por otras que llegan a tener aquí un buen desarrollo.

VIVEROS FORESTALES .-

a dudas, la obtención de plantas sanas, fuertes, y de segura adaptación al lugar de su futura plantación definitiva. Es por esto que los lugares que se elijan para la implantación de un vivero forestal, deberán estar situados en lugares del mismo habitat en donde se realizará la plantación, y esos lugares estarán constituidos por tierras completamente libres de agentes vatógenos y de una buena fertilidad.

temporarios, en aquellos lugares donde se planee una forestación de un área más o menos extensa. Los costos de producción por planta lograda en viveros temporarios de esta índole, así como su gran adaptabilidad y aclimatación al lugar en el cual serán plantadas, hace que la implantación de un vivero temporario, ya sea serrano, dunícola, etc., esté planeada en todo Plan Director de forestación racional. Hay que tener muy en cuenta todos los factores que llevan a que un vivero realizado en el propio lugar a forestar sea de positivos resultados económicos.

En primer lugar, los costos de producción logrados son may inferiores siempre a las plantas compradas en el comercio. Sebe para esto encararse la producción de plantas en forma masiva, para así hacer descender los costos por planta producida. Esobién los problemas originados con los transportes de las plantas a los lugares de forestación, constituye otro grave inconveniente, no sólo por los costos elevados, perjuicios sanitarios y de cambios de ambiente, sino también por las demoras que pudieran originarse provocando muchas veces la varalización de la plantación, que es como sabemos, un trabajo supeditado a los cortos meses invermales.

Es claro que no puede dejarse de reconocer la importancia de los grandes viveros forestales permanentes, cuya producción de plantas puede llegar a distintos sitios del país, mediante una buena organización en sus direcciones. Estos viveros pueden, por estar establecidos y por poseer muchos recursos económicos, llegar a ser verdaderas entidades madres en cualquier programa de forestación nacional.

rara la instalación de un vivero forestal permanente, con miras a la producción comercial de plantas, deben tenerse en cuenta una serie de factores, como ser: a) en primer lugar el lugar y suelo sobre el cual se instalará el vivero. Para la elección del suelo se dará preferencia a aquellos suelos sueltos, areno - arcillosos - humíferos, con buen drenaje. Serán preferibles los suelos arenosos frente a los arcillosos, pues los primeros darán un excelente sistema radicular en las plantas en ellos logradas, que aumentarán las seguridades de prendimiento de las plantaciones.

b) Se debeasegurar un buen abastecimiento de agua, ya sea obteniendo este elemento de los cursos de agua cercanos o ya extrayéndolo de las capas subterraneas. Se deberá también planear con cuidado el o los sistemas de riego a usarse. c) Se tendrá en cuenta también la disponibilidad de la zona en la que se instalará el vivero de mano de obra, pues los trabajos de cuidados de plantas (aunque varían con las distintas especies y formas en que se obtienen) requieren una mano de obra abundante.
d) Debe también prestarse atención a las caracteristicas de las zonas adyacentes al vivero y e) distribuir en el área dectinada todos los elementos de trabajo para lograr así una armónica distribución de las tarcas, sin pérdidas de tiempo ni inconvenientes.

derá en primer lugar, luego de elegido el sitio apropisdo, a elembrar su perímetro, utilizando para esta pperación materiales de mayor o menor duración, ya sea que se destine este lugar para un vivero permanente o temporario, respectivamente. En ambos casos debemos cuidar que los alambrados sean lo suficiente —
mente fuertes como para no dejar entrar a los ganados o distintos animales así como también deñe cuidarse de recubrir la cir-

ferencia con malla de alambre fino, para resguerdar la entradadde liebres y ottros animales al área del vivero.-

Una vez alambrado, se procederá a las imbores de la tierra, a los efectos de su preparación para la siembra de las especies forestales. Paralelamente a las labores que mencionamos se deberán plantar los cercos vivos circundantes, que generalmente y para nuestro país se realizan en base a coníferas del tipo de Pinus radiata, Cupressus lambertiana, Cupressus lusitanica etc. así como también procederse a la iniciación de los trabajos de construcción de lugares de enmacetado, medias sombras para enmacetados y depósito de las pequeñas plantitas repicadas, instalación del sistema de riego a usarse etc.

Si el vivero no forma parte de algún establecimiento ya instalado, deberá también procederse a la construcción de las viviendas para el parsonal estable del mismo. Por supuesto que todas estas operaciones deberán ser ejecutadas según un plan y proyecto estudiado de antemano, para que los resultados sean satisfactorios. Así se deberá estudiar cada una de estas a los efectos de calcular la posición y densidad de los cercos vivos, el tamaño y ubicación se gún la producción del vivero de la o las medias sombras para enmacetado etc.; la necesidad de riego especialmente en la época estival a los efectos de calcular la fuerza del motor y del sistema de riego, así como también las comodidades necesarias para el alojamiento del personal, y en general todos aquellos factoras que pudieran tenerse en cuenta a los efectos de una mejor organización de la explotación.

Aunque el riego para viveros, se puede distribuir, según Toumey y Korstian según los cuatro métodos siguientes: 1) por aspersión 2) por inundación 3) por acequias 4) por subirrigación en nuestro medio los métodos más corrientes son los de aspersión y de inundación.

debrá ser arada y rastreada, para luego procederse a la conformación de los canteros para la siembra de las diversas especies. .i se va a trabajar con macetas se procede a realizar las canchas de macetas, que generalmente son de hormigón o simplemente demarcando la tierra y dejando espacios para senderos entre ellas. Estas canchas se construyen generalmente de un ancho de 1.20 mt. a 1.50 mt. por un largo variable.

Por cada metro cuadrado de cancha entran:

- 126 macetas No. 9 trabadas .-
 - 77 macetas No.12 trabadas. -
 - 54 macetas No.14 trabadas. -
 - 90 95 latas de aceite lubricante de 1 lt.
 - 45 latas de aceite comestible de 2 lts.

Estas canchas de macetas deberán en lo posible construirse a un nivel inf rior al normal, para lograr que el riego sea más efectivo, mientras que los canteros deberán estar al nivel normal de los senderos que los rodean (preferentemente en suelos arenosos).

Estos canteros destinados a almácigos se construyen en diversos tamaños siendo mayores los que se destinarán al enviverado de estacas, por ejemplo de álamos, sauces, saucealamos, moreras, plátanos, etc. Los enviverados de estas estacas generalmente se realizan dejando una distancia entre planta y planta de 0,30 m. a 0,50 m. y entre fila y fila de 0,80 m. a 1.00 m. Su tamaño oscila casa siempre entre los 0,40 m. y los 0,60 m. de lorge, obtenidas de ramas vigorosas de plantas madres, y se plantan enterrándose por lo menos hasta la mitad de su longitud.

Al construirse las canches y canteros deberán tembién reclinarse las cajoneras para la siembra de almácigos bajo vidrio, las estercoleras, y algunas construcciones suplementarias para depósito de herramientas, etc.

Trabajos del vivero .-

Las siembras de coníferas se realizan en carteros o directamente en envases (poco frecuente) principalmente
durante la estación otoñal, pues hay menos posibilidades de ataque de Damping-off especialmente en las especies más plantadas
en el país, como lo son los Pinus radiata y pinaster. Las especies latifoliadas, como los fresnos, olmos, arces, etc., se
siembran en la primavera, en surcos separados 0,80 mts.

Las diversas variedades de Eucalyptus se siembran general-

mente en almácigos al voleo, repicándose las plantitas cuando tienen una altura de 4 - 5 cms. Se realiza la siembra de Eucalyptus sp. generalmente en primavera a razón de 50 a 70 grms. por mº. Estos repicados a envases de distintos tipos, se realizan como ya dijimos, en el vivero en lugares de trabajo apropiados a estos efectos, que generalmente y más en el verano, están protegidos por una media sombra donde se dejan luego las jovenes plantitas recientemente transplantadas hasta que adquieran el vigor suficiente para resistir los soles fuertes y otros factores climáticos adversos. Estas plantitas repicadas deberán tener un abundante riego durante los primeros días de realizada es taoperación, así como también en lo sucesivo se cuidará que sus raices no pasen el orificio del envase y penetren en la tierra(picado de las raíces) pues luego será riesgosa su plantación definitiva. Para evitar en parte los efectos del picado, cuando se utilizan los envases de latas, es conveniente preticar agujeros no en la parte basal del envase, sino a los costados del mismo, pero en la parte basal del costado, a los efectos que la raíz emerja por esos orificios y no penetre directamente en la tierra.

En cuanto a los tipos de envases usados, puede decirse que se dividen en varias clases:

- a) Macetas de barro cocido. Las hay de diferente tamaño, siendo las más comunes las de diámetros de 9 y 12 cms.
- b) Latas de comestibles y lubricantes de 1 y 2 lts.- Estas se consiguen en el momento actual a un costo menor que las macetas de barro cocido pero tienen el inconveniente de que solamente se pueden usar una vez. Las latas de un lt. valen \$ 50.00 el mi llar mientras que las macetas de 9 cms. están valiendo 100.00 \$ el millar y las de 12 cms. \$ 150.00 el millar.
- c) Envases de cartón alquitranado.- Rovedoso envase de precio reducido que permite la plantación definitiva en el propio envase.
- d) Envase de terrón. Muy barato por consistir simplemente en un terrón de tierra y pasto.
- e) Macetas de barro crudo. Mezcla de barro y paja que se moldea o que se introduce en caños de diferentes diámetros y a su salida se corta en trozos.

Generalmente para el transporte de las macetas a la plantación se utiliza el cajón tipo Toledo, que es un cajón de listones de tablas de un largo de 55 cms. por un ancho de 35 cms. y uma altura de 30 cms., en el cual caben 125 plantas en macetas de 9 cms. de diámetro. Se disponen trabadas en tres filas y acondicionadas con paja y arpilleras en la boca del cajón.

Fambién estos cajones pueden utilizarse para el transporte de plantas a raíz desnuda, como los pinos, pero para estos se usa más generalmente el atado de los manojos de plantas recubiertos por arpilleras y acondiconados con varillas y alambres.

Se describen a continuación las diferentes especies sobre las cuales se han realizado especiales observaciones en diferentes viveros.-

- 1) Acacia longifolia (Acacia trinervis)
- 2) Acer negundo (Arce común)
- 3) Alamos hibridos italianos 214.-
- 4) Araucaria angustifolia.-(Fino Brasil)
- 5) Casuarina cumminghamiana. (Casuarina)
- 6) Cupressus sempervirens. (Ciprés comin)
- 7) Eucalyptus saligna.-
- 8) Fraxinus alba, (Freeno americano)
- 9) Fraxinus excelsior.-(Fresno europeo)
- 10) Pinus pinaster. (Pino marítimo)
- 11) Pinus radiata.-(P.insignis)
- 12) Finus elliottii.-
- 13) Robinia pseudoacacia.-(Acacia blanca)
- 14) Taxodium distichum.-(Ciprés calvo)

1) Acacia longifolia -- (Acacia trinervis)

Esta especie se usa principalmente en nuestro país para cubrir zonas arenosas que necesitan ser fijadas con árboles. Así se ocserva en grandes extensiones a lo largo de nuestro litoral costero.

La siembra de esta esencia se realiza en la primavera, utilizándose normalmente 50 grms. de semilla por m² de almácigo. Imego se repican a los dos o tres meses a envases en los cuales se llevan a la plantación definitiva al siguiente invierno. → (Vivero Parque Roosevelt, Vivero Solymar, Viveros Sofimma, etc.)

2) Acer negundo.-(Arce común)

Es esta una especie latifoliada que, aunque es originaria de climas fríos, se adapta muy bien a nuestro medio ambiente. Su cultivo se realiza haciendo los almácigos en la primavera, sembrando la semilla en surquitos separados 20 - 30 cms. En el invierno siguiente cuando han volteado la hoja, se enviveran a una distancia de 30 a 40 cos. entre planta y planta, para luego de un tiempo, que puede variar con las circunstancias, llevarse a la plantación definitiva a raiz desnuda. - (Vivero Nacion 1 de Toledo)

3) (lamo hibrido italiano ver. 214.-

Estos híbridos, de gran adaptación y futuro en nuestro país, se propagan facilmente por estacas, enviverándose a una distancia de 40 cms. entre plantas y de 80 cms. a 1.00 m. entre filas. Dan un barbado muy vigoroso al siguiente año. (Vivero Celulosas del Uruguay 8.A.).-

4) Araucaria angustifolia .- (Pino Lrasil)

Especie esta de clima templado cálido, se adapta bien en nuestro medio. Su cultivo se realiza sembrando las semillas enseguida de cosechadas (otoño - invierno) y enviverándo las plantas luego en tierra o sembrando la semilla directamente en envases de gran tamaño (latas de café), hasta su plantación definitiva. (Vivero Macional de Toledo).-

5) Casuarina cuminghauiana.-(Casuarina)

Su cultivo se realiza efectuando los almácigos en la primavera, y repicando las plantitas cuando tienen una altura de 5 cms. a envases (generalmente macetas de 9 cms.) Es una especie de lento crecimiento. (Vivero Solymar).

6) <u>Cubressus cempervirens.-</u> (Cipré común)

Esta especie se siembra de almácigo generalmente en la estación primaveral, aunque admite también siembra otoñal, como otros ti-

pos de cipreses. Generalmente se repican a envases pidiendose también enviverar en tierra. (Vivero Colymar).-

7) Eucalyptus saligna .-

Esta especie se está plantando bastante actualmente, pues es de rápido exceimiento y dembuena calidad de madera. Su cultivo se realiza, como para otros Ducalyptus, haciendo los almácigos en la primavera, para repicar las plantitas a envases(distintos tipos) generalmente cuando han transcurridos un par de meses de la siembra. Luego se llevar a la plantación definitiva durante el invierno cuando las plantitas tienen un tamaño de aproximadamente 50 cms. de altura. - (Vivero Solymar, Vivero Farque Reosevelt).

8) Fraxinus alba.-(Fresno americano).-

Especie latifoliada de gran resultado dentro de su tipo en nuestro país. Se realizan las siembras de semillas en la primavera, enviverándose luego en tierra generalmente al invierno siguiente para plantarse finalmente a raiz desnuda. Da un amadera de buena colidad, blanca, fácil de trabajar. (Vivero Lacional de foledo).-

9) Fraxinus excelsior .- (Fresno europeo)

Como el anterior es de buen crecimiento en nuestro ambiente, y produce también una madera de buena calidad, dura, facilmente trabajable. Su cultivo es similar al del fresno americano.-(Vivero Nacional de Toledo.-)

10) linus pinaster .- (Pino marítimo)

Especie muy conocida en el país, por haber sido la base de la forestación del litoral marítimo. Tiene aquí un crecimiento que ha sorprendido a los técnicos llegados de su región de origen, que lo es el Mediterráneo. Está clasificado como pino tea, y su cultivo se realiza efectuándose los almácigos principalmente en el otofio y principios de invierno, para evitar riesgos de Damping - off, que lo ataca. De deben desinfectar las tierras que se van a utilizar para su cultivo y adicionarles hojarasca de pino.

En el invierno siguiente las plantitas han alcanzado una altura de 25 a 50 cms. que las habilita para ser plantadas. Su plantación se realiza por lo común a raiz desnuda, por ser más

económico, pudiéndose extraer de un metro lineal de almácigo de 30 cms. de ancho entre 300 y 500 plantitas.—(Vivero Parque Roosevelt, Vivero Solymar, Vivero Sofimma S.A.)

11) Pinus radiata.-(p. insignis, monterrey)

Especie muy indicada para las forestaciones serranas. Obtiene en todo el país un crecimiento bueno, y su plantación a raíz desnuda la hace muy económica. Como otras pináceas se siembra en el otoño para alcanzar en el ciclo de un año plantas fuertes de buen tamaño. (Vivero P.Roosevelt, Vivero Solymar, Viveros Celulosas del Uruguay S.A., Vivero Sofimma S.A.)

12) Finus elliottii.-

Especie de la cual todavía se tiene poca experiencia en elpáis, se piensa que pueda servir para las forestaciones de valles y zonas bajas, como complemento del P. insignis.- (Vivero Celulosas del Uruguay S.A.)

13) Robinia pseudo acacia.-(Acacia blanca)

El cultivo de esta especie, productora de una madera muy aptapara diveros usos rurales e industriales, se realiza efectuando los almácigos en la primavera en surcos, para transplantar
en el invierno las plantitas logradas enviverándolas en plena
tierra, separándolas un metro entre fila y fila y 30 a 50 cms.
entre plantas. En el vivero donde la observamos estaba destinada a plantarse en las costas de los arroyos y cañadas.-(Vivero
Celulosas del Bruguay S.A.)

14) Taxodium distishum - (Ciprés calvo)

Especie muy indicada para la arborización de las zonas de bañados, su cultivo se realiza haciendo los elmácigos en la primavera, sembrando las semilla en surces, y enviverando las plantas conseguidas al invierno siguiente, para luego de un tiempo variable, que puede llegar a ser de 2-3 años, llevarse a la plantación definitiva.— (Vivero Parque Roosevelt)

Viveros. - (cont.)



Instalación de agua (Vivero Solymar)



Media sombra (Vivero P.Roosevelt)




Lugar protegido
para enmacetados(V.Solymar)



Mesa de enmacetados (Vivero Fac. de Agronomía)

Viveros. - (cont.)



Macetas de barro para almácigos (V. Fac. Agronomía)



Pinos insignis y pinea.(envases de barro cocido
y cartón.V.P.Roosevelt)



Canchas de hormigón con macetas de 9 cms. (Vivero P. Roosevelt)



Pinos insignis (Vivero Solymar)

ESTUDIO DE UNA EXPLOTACION FORESTAL

(Celulosas del Uruguay S.A.)

1) Objetivos:

Será tema de este estudio una explotación forestal integral, con los capítulos correspondientes a la implantación de un vivero forestal serrano, plantaciones forestales y explotación pos terior del bosque logrado. Se prestará preferente atención a la explotación forestal como fuente de trabajo para una zona en que es muy necesaria la colocación de la mano de obra. Viene a sustituir este tipo de explotación la industria de la ganadería extensiva, que obviamente, y mucho más aún en esta área, emplea un personal muy inferior a la industria forestal.—

11) Situación del predio:

5a. sección judicial del Dpto. de Maldonado, paraje ce nocido como Abra de Castellanos, extensión : 2.778 Hás.

111) Características del lugar y especies apropiadas:

Este lugar está constituído por serranías y lugares pedregosos, y por laderas y valles de suelo suelto franco arcilloso. La elección de especies a plantar se ha realizado teniendo en cuenta estas características. Es propósito de la firma propietaria forestar este campo en toda su extensión para la obtención de materia prima destinada a la industria papelera. Es su finalidad lograr un bosque de doble propósito, manejando en tal forma el bosque, de lograr extraer celulosa de raleos y puntas y tablas del remanente. Se han buscado y adaptado a estos efectos las especies propias de sitios forestales serranos, con un turno mínimo de explotación, ha -

biéndose seleccionado especies tales como Pino insignis, P. elliotii, y P. patula. La situación agro-ecológica de este lugar hace muy interesante la explotación de estas esencias para los fines ne cesarios a la industria papelera.

También se están plantando otras especies como Acacia blanca, Alamo variedad 214 en grandes cantidades y latifoliadas del tipo de fresnos, arces, olmos y nogales para otros tipos de terreno dentro del mismo predio.-

1V) Plan Director de la plantación forestal:

El plan director que se ha estructurado para esta explotación comprende en sus puntos básicos el ordenamiento de las labores de plantación a realizar en un turno comprendido en el lapso de los próximos 10 años.-

Teniendo en cuenta que la superficie total del área a forestar supera a las 2.500 Hás. se han hecho planes para la plantación anual de una superficie de unas 250 Hás., variando esta cifra en algunos años en mayor o menor cantidad teniendo en cuenta los diferentes tipos de suelo que comprende la plantación. Así tenemos que se deberán utilizar distintos sistemas de plantación según sean áreas de lomas de cerros, laderas, valles o superficies cubiertas con montesindígenas.—

nunciada la intensidad anual de forestación. Un inconveniente grande lo constituyen los factores climatéricos, que restan muchas jor nadas de labor durante los meses de plantación, es decir principal mente durante los meses invernales. Otro factor sería la disponibila lidad de plantas de coníferas y barbados de álamos principalmente, que aunque en este caso son de producción propía, podría haber inconvenientes en cuanto a su producción de diversa índole. Hay años en que escasean en plaza las plantas forestales, cosa esta que no acontece durante el presente año.—

También la escasez de mano de obra podría hacer decrecer el ritmo anual de plantación, factor este que es difícil que a contezca en nuestra área determinada, por ser como ya dijimos, muy . undante la mano de obra.-

Finalmente otras causas podrían hacer variar el ritmo de plantación anual pero de manera favorable. Por ejemplo en el presente año el subsidio otorgado por el Gobierno como estímulo a las plantaciones forestales consistente en \$250.00 por Há. plantada con recursos a cargo del Fondo de Detracciones y Recargos, logicamente hace pensar que se aumentarán en mucho las forestaciones del presente año.—

Una vez lograda la plantación total del área, se procederá a los primeros raleos, a los efectos de la producción de materia prima para la futura industria de la producción de papel. Variará entonces fundamentalmente el tipo de trabajo a desarrollar en esta explotación, ya que las labores que ocupaban hasta el presente el lugar de mayor importancia, como son las labores de vivero y plantación, se verán sustituídas por un nuevo tipo de traba - jos, esta vez los primeros pasos de la explotación maderera industrial. Será entences que elp reconal de la plantación pasará paulatinamente a efectuar otras labores, principalmente de protección y limpieza primero del bosque logrado, y subsecuentemente de cosecha del monte artificial.-

Se instalarán así en el lujar aserraderos para la industrialización de tablas para diversos usos, principalmente encofrados y cajonería, así como también peladoras de palos.

Se supone que el actual personal de más de 20 hombres en épocas normales y que actualmente supera los 30 en épocas de plantación, superará uma vez establecido el bosque la cantidad de 60

nombres, necesarios para las futuras labores que se han enunciado.

Abunda también el Flan Director de esta explotación
en las futuras transformación de las cuencas actualmente erosionadas de ríos y arroyos y otros valores consecuencias de la creación
de este macizo forestal.-

V) Personal de la plantación:

El personal actual de la plantación, comprendiendo den tro del mismo a los dos Ingenieros Agrónomos que la dirigen, y tam - bién al personal eventual que se contrata durante los meses de la plantación, se puede enunciar de la siguiente manera:

- 1 Ing. Agr. Director
- l " encargado del establecimiento
- 1 Capataz general
- l Encargado de cuadrillas
- 3 Tractoristas
- 2 Viveristas
- 10 Plantadores (que trabajan todo el año en el establecimiento)
- 10 " (que se contratan durante la época invernal)
- 2 Hormigueros
- 1 Casero

Calculamos para cada obrero un promedio de 25 días de trabajo mensuales, que nos daría a un jornal de 8 horas de labor un nas 200 horas mensuales por trabajador.-

Los trabajos que realiza este personal difieren funda mentalmente durante los distintos meses del año, divididos en los 3 rubros de la explotación, es decir trabajos de vivero, plantación y trabajos generales. (Ver gráfica de insumo, distribución y mano de obra asalariada).-

A todo este personal de capataces peones se les paga el salario que marca la ley para empleados rurales secos, es de - cir que no se les mantiene en el establecimiento, aunque pueden dormir y hacerse la comida en el mismo. Como son normalmente gentes

de los alrededores, el traslado hasta la plantación les resulta muy accesible.-

Los jornales son los siguientes:

Capataz: \$23.00 diarios

Encargado

de cuadrillas:

\$18.50

Peones: \$17.20 '

Casero (mantenido)

\$280.00 mensuales

Estos son los jornales que perciben integros los obreros, encargándose la empresa decabonar los suplementos correspondientes a las diferentes cargas sociales.-

Es preciso agregar aquí que la mano de obra que ocupaba anteriormente este predio dedicado a la explotación ganadera era de un capataz y tres peones de campo, que se ha visto superada, como lo dejamos sentado anteriormente, grandemente por el insumo de mano de obra por la explotación forestal.—

Cabe destacar que como ya también dijimos, esta mano de obra que actualmente se utiliza se verá incrementada varias veces en los pasos futuros de la industrialización del bosque que actualmente lleva vías de creación.

Viviendas del personal:

Es intención de la dirección técnica del establecimiento hacer núcleos de viviendas para los distintos tipos de trabajadores. Así se proyecta hacer en una sección del establecimiento las vivien das para el personal forestal propiamente dicho, es decir todos aquellos empleados que se dediquen a las tareas de viveros foresta-

les, plantación y cuidados del bosque (limpieza, podas, aclareos, entresacas, etc.).-

En una sección aparte se instalarán las viviendas de los trabajadores de la parte relativa a la explotación de la madera, es decir los que trabajen en aserradero y plantas de celulosa.-

Se logrará de esta manera encaminar mejor las tareas y evitar problemas de distinta índole.-

Plantación serrana .- Celulocas del Uruguay S.A.

Planilla de distribución e insumo de la mano de obra.-

(en horas / hombre)

| TRABAJO | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio |
|---------------------|--------------|---------------|-----------|-------|--------------|-------|
| Preparación de | | | | | | |
| la tierra | 200 | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Desinfección | | | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Siembras y es- | | | | | | |
| tacados | 454 4 | :4 4-4 | 100 | 200 | 100 | 200 |
| Cuidados cultu | | | | | | |
| rales | 100 | 100 | 100 | 200 | 100 | 100 |
| Riego | 300 | 300 | 300 | 300 | 200 | 100 |
| Prep. y transp. | | | | | | |
| a la plantación | | | w | 200 | 200 | 200 |
| | | | | | | |
| Preparación de | | | | | | _ |
| la tierra | 500 | 200 | 500 | 300 | 400 | 600 |
| Apertura de po- | | | | | | |
| 208 | | | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Plantación | | | w | 2000 | 30 00 | 3000 |
| Cuidados poste- | | | | | | |
| riores | | | 800 | 800 | 800 | 600 |
| Reposi ció n | | | | | 400 | 400 |

Vivero:

Plantación:

| TRABAJO | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio |
|----------------|--------------|---------|-------|-------|------|-------|
| Trabajos ge- | | | | | | |
| nerales | 800 | 1200 | 800 | | | |
| Cuidados de | | | | | | |
| equipos | 400 | 400 | 400 | | | |
| Realización y | | | | | | |
| conservación | | | | | | |
| de caminos etc | . 700 | 800 | 200 | | | 9744 |
| Trabajos de | | | | | | |
| dirección | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | | | | | | |

Trabajos generales :

Planilla de distribución e insumo de la mano de obra.- (cont.)

(en horas / hombre)

| TRABAJO | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviem. | Diciem. |
|----------------------|---------|--------|-------------|---------|---------|------------------|
| Preparación | | | | | | |
| de la tierra | 100 | 100 | | | | |
| Desinfección | 200 | 200 | | | * | 4700 |
| Siembras y | | | | | | |
| estacados | 200 | 100 | | **** | | 700 sign 450 470 |
| Cuidados cul | | | | | | |
| turales | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 100 |
| Riego | 100 | 100 | 200 | 200 | 400 | 400 |
| Prep. y trans | sp. | | | | | |
| a la plantaci | .ón 200 | 200 | | - | | |
| Preparación | | | | | | |
| de la tierra | 500 | 600 | | | | 500 |
| | 900 | 600 | | | | J 0.7 |
| Apertura de | | | | | | |
| pozos | 600 | 600 | | | - | - |
| Plantación | 3000 | 3000 | - | | **** | |
| Cuidados pos- | • | | | | | |
| teriores | 600 | 600 | 1200 | 1300 | 800 | 800 |
| Reposición | 400 | 400 | 600 | 400 | | |

Vivero :


Plantación:

| TRABAJO | Julio | Agosto | Setismbre | Octubre | Moviem. | Diciem. |
|------------|----------|--------|-----------|---------|---------|---------|
| Trabajos g | enerales | | 800 | 800 | 1000 | 800 |
| Cuidados d | е | | | | | |
| equipos | **** | | 500 | 500 | 400 | 400 |
| Realizació | n y | | | | | |
| conservaci | ón | | | | | |
| de ceminos | etc | | 400 | 400 | 1000 | 800 |
| Trabajos d | е | | | | | |
| dirección | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |

Trabajos generales :

El insumo de mano de obra total se calcula que sea tenien do en cuenta las cifras analizadas de 60.000 horas/hombres anuales, sifras que si se compara con la de mano de obra utilizada en la explotación ganadera extensiva anterior (de aproximadamente 5.000 horas/hombre anuales) dará con elocuencia la mayor absorción de material humano de la explotación forestal.—

(Ver gráfica).-



*

V1) VIVERO: Costos de implantación y mano de obra.-

El vivero forestal que se ha construído a los efectos de la producción de plantas, está encarado en los momentos actuales de tal manera que toda su producción se utiliza en el establecimiento.

En el futuro, se han hecho proyectos para la ampliación de este vivero así como también la construcción de otro vivero forestal, a los efectos de producir plantas cuyo bajo costo de venta sea incentivo y fomento para la forestación de zonas vecinas al actual predio.-

Una vez establecida una industria de la madera en este lugar, y siéndole posible a los productores rurales de la zona la adquisición de plantas de árboles a un costo muy reducido, como es el que se puede lograr en estos viveros, creemos que la forestación serrana, se verá enormemente favorecida.-

El actual vivero se ha instalado sobre una superficie de aproximadamente 2 Hás. habiéndose seleccionado un lugar de suelo suelto, franco, de fácil acceso, cercano al casco actual de la estancia, y situado en las proximidades de un curso de agua, es decir dotado de facilidades para el riego.

Como ya dijimos al empezar este trabajo, las especies que se han seleccionado para la plantación forestal en esta área, comprende a los Pinus radiata, como especie apropiada para zonas al tas serranas, al Pinus elliottii como especie para forestar las zonas bajas de estos lugares y también como experiencia nueva, se ha empezado con la producción del Pino patula, sobre el que se tienen grandes esperanzas.

A la producción de estas coníferas se agregan en el vivero los elámos 214, la acacia blanca(Robinia pseudoacacia) y distintas latifoliadas. Además se está produciendo este año Eucalyptus saligna, especie de la cual se espera una buena cosecha también.

La siembra de confferas se empieza en este vivero normalmente durante el mes de Marzo, es decir apenas empezado el Otoño,
prolongándose durante todo el invierno hasta el mes de Agosto inclusive.

La semilla de Pinus radiata es de origen chileno y la de P. elliottii y P. patula es de origen norteamericano. Se tuvo especial cuidado en seleccionar semilla de buen origen y certificada y tratada con funginidas, a los efectos de asegurar una buena germinación y por consecuencia una buena producción.

La siembra de conífera se efectuó en los canteros cuyas dimensiones se enuncian más adelante, haciéndose tratamientos de desinfección con ácido sulfúrico y con Orthocide(3 tratamientos) a los efectos de prevenir principalmente el Damping off.

Con el producto Orthocide se realizaron tres tratamientos y el M2804 se utilizó comercial de 60° Bé., regándose la tierra a razón de 3 lts./m² utilizándose 200 c.c. de H2804 cada 10 lts. de agua.

También se adicionaron a estos canteros previamente a la siembra tres viajes de hojarasca de pino(pinocha) para los doce canteros, trabajándose luego la tierra a los efectos de mezclar bien este agregado de hojarasca.

Es de hacer notar que este procedimiento se efectúa p a-

ra incorporar a esta tierra que nunca había sido utilizada para vivero de pinos el cultivo de hongos Micorriza, esencial para el desarrollo de estas coníferas.

La siembra de pinos se efectuó en surcos, separados u - nos 30 cms., del largo del cantero, es decir 60 m. Se calculó de haber sembrado aproximadamente un millón de semillas.
Porducción del vivero:

Este vivero posee 12 canteros que se utilizan para la producción de pinos. Se calcula que cada cantero, de 60 m. x 5 m., pueda dar alrededor de 72.000 plantas, pues está dividido a su vez en 12 filas que dan cada una unas 6.000 plantitas. De esta manera en 12 canteros tendremos una producción anual de unos 800.000 pi - nos. Es claro que como la plantación se realiza en forma escalonada desde Abril hasta Agosto, también la siembra de pinos se realiza en esta forma, desde Marzo a Agosto.

Calculando los costos de producción, renta y jornales hemos llegado a la conclusión de un costo unitario por plantita de \$0,04, costo este inferior en mucho al actual precio del millar de pinos, que es del orden de los \$100.00 el millar.-

También se utilizaron otros sistemas de siembra: Se sembró Pino radiata directamente en macetas y en envases de cartón alquitranado. Se destinaron estas plantas para plantar en lugares alejados del vivero así como también para plantarlas durante épocas no tan favorables.-

Además se experimentó el año pasado el sistema de siem bra directa, sembrándose en hoyos escarificados sobre el suelo bru to varias semillas efectuándose luego el trasplante de los hoyos

٦٥

en que han germinado más de una semilla, a los hoyos en que ha habido germinación.-

Diversas causas conspiraron contra este sistema, que fue luego abandonado. En primer lugar no se puede pretender que una plantita germine y que recién nacida se defienda contra pájaros, hor migas etc., en pleno campo, frente a las que se enviveran en un lugar seleccionado, de tierra trabajada y bien cuidado como un vivero. En segundo lugar se hace muy dificultosa la incorporación de micorrizas a lugares tan pequeños y numerosos como los pequeños hoyos

Además sufre este tipo de plantación en siembra directa de otro defecto que es el principal en las plantaciones realizadas en pozo, ya sea este abierto a pala o con pocera acoplada
al tractor. Se trata de que las plantas encuentran un ambiente para
el desarrollo de sus raíces que es apropiado dentro del pozo, pero
que de ningún modo es apto fuera del mismo pues la tierra se halla
sin trabajar. Es entonces que la pequeña planta limita el desarrollo
radicular a la zona del pozo, disminuyendo así su crecimiento. En
cambio, en el sistema de plantación sobre tierra arada esto no a contece, encontrando las raíces de los árboles un espacio uniforme
para su desarrollo.-

Con respecto al enviverado de álamos, estos fueron obtenidos de estacas que plantadas en el vivero en filas separadas de 0,80 cms. y con una separación entre planta y planta de 0,40 cms. dieron este año un barbado (las de variedad 214 principalmente) de grandes dimensiones, que alcanzaron en algunos casos a sobrepasar la altura de dos metros.

Estos barbados antes de su plantación definitiva, que se efectuó en el invierno de 1961, fueron utilizados para obtener

stacas, que se enviverarán para ser plantadas a su vez el inviern o que viene.-

Hay que hacer notar aquí el diferente crecimiento que se observó entre los barbados de álamos var. 214 y los barbados de la variedad A.M.. Mientras que los primeros alcanzaron, como ya dijimos, una altura superior a los 2 m., los barbados de la var. A.M. alcanzaron alturas mucho menores. Aunque todavía no se posee ninguna experiencia al respecto sobre estos terrenos, puede asegurarse que la variedad americana antes mencionada tiene una gran pre ponderancia sobre los A.M..

También la Robinia pseudoacacia fue enviverada en fillas como los álamos, empezándose a plantar algunos ejemplares de esta especie en las partes cercanas a cursos de agua.-

Finalmente el cultivo de Eucaliptus saligna fue realizado sembrándose la semilla en almácigos y transplantándose las
pequeñas plantitas a macetas de 0,09 de diámetro, disponiendo estas
macetas en canchas de 1,50 m. de ancho por 20 mts. de largo, tapán
dolas por sus costados con tierra para prevenir los excesos de eva
poración, especialmente durante los meses estivales.-

El costo de instalación de este vivero se traduce en los siguientes datos:

- A) Costo de alambrados
- b) " instalación para riego
- c) " s de cortinas vivas circundantes
- a) * construcción media sombra
- e) " preparación de la tierra (labores)
- f) " de trabajos de desinfección y siem bra

g) Costo adición de pinocha

Como nos referimos al costo de instalación, se omite el valor de la renta de la tierra.-

a) Alambrados:

| Alambre: 17/15 3 Rollos de 14.50 mts. c/u | g \$200 | \$ | 60 0.00 | | | | | | |
|--|---------------|-------------|-----------------|--|--|--|--|--|--|
| Piques : 320 piques a | \$1.00 c/u | \$ | 32 0. oo | | | | | | |
| Postes: 50 postes a \$10.50 " | | | | | | | | | |
| Malla fina contra liebres: | | | | | | | | | |
| (Colocada a una altura de 50 cms.) 300 mts. | a \$14 c/u | \$ 4 | •200 | | | | | | |
| Mano de obra: (se calcula en el lugar a \$65 | oo la cuadra) | \$ | 455.00 | | | | | | |
| TOTAL COSTO ALAMBRADO: | | \$6 | .200 | | | | | | |
| b) <u>Instalación de riego:</u> | | | | | | | | | |
| 1 motor Clinton 2 1/4 HP. | \$2.800 | \$2 | .800 | | | | | | |
| 250 mts. caño Plastiducto a \$14.00 el 1 | n. | \$3 | • 500 | | | | | | |
| 8 canillas a \$20.00 c/u | | \$ | 160 | | | | | | |
| 3 Mangueras de 30 m. c/u a \$5.00 el 1 | m. | \$ | 450 | | | | | | |
| Mano de obra de instalación: | | | | | | | | | |
| 30 jornales a \$17.20 | | \$ | 516 | | | | | | |
| Gastos piezas menores, etc. | | \$ | 60 | | | | | | |
| Total costo instalación | riego: | \$7 | .486 | | | | | | |
| c) Cortinas vivas circundantes: | | | | | | | | | |
| Se plantaron 5 hiloras de pinos insignis par | ra | | | | | | | | |
| protección de vientos a un costo de | | \$ | 100 | | | | | | |
| d) <u>Media sombra:</u> | | | | | | | | | |
| Total gastos: | | \$ | 100 | | | | | | |

e) Labores (preparación de la tierra):

| Arada y rastreada (contratada) | | | | | | | | | |
|---|--------|------|----------------|------------|-------------|--------------|--|--|--|
| 2 Hás. con 2 aradas y rastreadas a \$120.00 la Há. \$ 480 | | | | | | | | | |
| Construcción de canteros: | | | | | | | | | |
| 12 canteros de 60 m. x 5m. a 3 jor | nales | c/u | | | | | | | |
| | | \$ 5 | 51.60 | | \$ | 619,20 | | | |
| Canteros álamos y acacia blanca 10 | jorns | les | a | | | | | | |
| | | \$] | L 7. 20 | | \$ | 172 | | | |
| | T | TAL | LABOR | es: | \$ 1 | .271,20 | | | |
| f) Desinfección y siembra: | | | | | | | | | |
| Semilla: Pino radiata (insignis) | 50 Kgs | s. a | \$ 40. | 00 | \$2 | •000 | | | |
| " patula | 5 " | R | \$300. | 00 | \$1 | • 500 | | | |
| " elliottii | 5 " | 17 | \$300. | o o | \$1 | • 500 | | | |
| Acacia blanca | 10 " | 11 | \$ 60. | 00 | \$ | 60 | | | |
| | T | TAL | es: | | \$ 5 | •060 | | | |
| Estacas: Alamo 214 a \$60.00 el mil | .lar | | | | | | | | |
| 20 | .000 | sta | cas | | \$1 | •200 | | | |
| Desinfectantes: H2S64 y Orthocide | | | | | \$1 | •000 | | | |
| Mano de obra: 60 jornales a \$17.20 | 1 | | | | \$1 | •032 | | | |
| | T | TAL | : | | \$8 | .292 | | | |
| g) Adición de pinocha a canteros: | | | | | | | | | |
| 3 viajes de pinocha a \$110.00 el v | riaje | | | | \$ | 330 | | | |
| Mano de obra : 10 jornales a \$17.2 | 20 | | | | \$ | 1 7 2 | | | |
| | T | TAL | COSTO | PINOCHA: | \$ | 502 | | | |
| TOTAL COSTOS IMPLA | NTACI(| v rc | IVERO | 2 | \$24 | .151 | | | |
| | | | | | | | | | |

En este vivero se dejan permanentemente dos viveristas, que son reforzados por personal adicional durante las épocas de ma yor trabajo. El riego es el trabajo fundamental que requiere que en el vivero haya mano de obra durante todo el año, así como también los trabajos generales de limpieza.


Se calcula que se deben regar por lo menos de promedio 180 días anuales es decir un día sí y un día no.-

Las épocas de mayor labor en el vivero son los meses de otoño e invierno en que se efectúan las labores de la tierra, la siembra, desde marzo continuando hasta agosto, los estacados, y al mismo tiempo el arrancado de las plantitas y su acondicionamiento para enviarlas a la plantación.-

Vivero de la firma Celulosas del Uruguay S.A ..-



Almácigo de Pinus radiata (P. insignis) sembrado en Otoño 1961.-



Almácigo de P. radiata pronto para su plantación def.



Pinus radiata sembrado directamente en envase de cartón alqui tranado.-



Barbados de un año de álamo variedad 214.-

VII) PLANTACION:

La plantación se inicia, como ya hemos dicho, con los primeros fríos, y se prolonga hasta el mes de A gosto, tomando su mayor intensidad durante los meses de Junio, Julio para terminar en Agosto.

La plantación anual se realiza de acuerdo al Plan Director, pero como ya se mencionó, varía su intensidad debido a di versos factores.-

Se forestan actualmente distintas zonas con distintos tipos de suelos. Debido a este hecho es que se han utilizado di
versos sistemas de plantación que se enumeran a continuación:

- a) <u>Plantación sobre suelo arable: Se</u> rotura sobre estos terrenos como en una explotación agrícola, plantándose una vez que la tierra esté pronta, los árboles con el sistema denominado de Pala Michigan. Consiste esta pala en una cuña de hierro que permite una rápida plantación, hasta el punto que un obrero de promedio normal puede plantar unos 800 árboles por día.—
- b) <u>Plantación sobre suelos no arables:</u> Sobre estos tipos de terrenos se están utilizando en esta explotación dos sistemas de plantación diferente:
- 1)Plantación en pozo abierto con pocera acoplada al tractor.-
 - 2) " " " pica

gallega.-

El primero de estos sistemas es el más conocido de los dos, y se calcula que una pocera puede abrir unos 800 pozos por

por día de 8 horas.-

El sistema de la "pica gallega", consiste en abrir los pozos con una especie de azada y colocar la planta tapándola con el mismo instrumento.-

Con este implemento un obrero puede plantar de 400 a 500 plantas diarias. Se está actualmente plantando a una densidad de 2 mts. x 2.5 mts. es decir unos 2.000 árboles por Há.

Las plantas son llevadas desde el vivero hasta el lugar de la plantación definitiva en cajones acondicionados en zorras remolcadas por tractor.-

Cada peón arranca 100 pinos de los canteros en unos 5 minutos, es decir que en 8 horas de labor puede encajonar unos 10.000 pinos.-

Costos por Há. plantada utilizando los diferentes sistemas de plantación.- (a planta prendida).-

| a) Plantación sobre tierra arable y Pala Michig | a) | Plantación | sobre | tierra | arable | Y | Pala | Michiga |
|---|----|------------|-------|--------|--------|---|------|---------|
|---|----|------------|-------|--------|--------|---|------|---------|

| 2000 pinos a \$40.00 el millar | \$ 80.00 |
|---|----------|
| 20% reposición | \$ 16.00 |
| Aradas y rastreadas (contratadas 2 y 2) | \$200.00 |
| (Teniendo equipo propio, \$60.00 l arada y rastreada) | |
| Jornales plantación : 2 y medio jornales a \$24.00 | \$ 60.00 |
| (Jornales de \$17,20 incluyendo cargas sociales) | |
| Jornales cuidados post-plantación | \$ 20.00 |
| Transporte de las plantas a la plantación | \$ 4.00 |
| Gastos jornales capataces, dirección, etc. | \$ 4.00 |
| TOTAL: | \$384.00 |

Realizando las labores con equipo propio, este costo se reduciría a \$ 304.00.-

b) Plantación sobre tierra no arable: (Plantación en pozos)

| 1) Plantación en pozo abierto con tractor y pocera acoplada | : |
|--|-----------------|
| 2000 Finos a \$ 40.00 el millar | - \$ 80.00 |
| 20% reposición | \$ 16.0o |
| Apertura de pozos (calculando que un tractor puede abrir 80 | o pozos |
| diarios, a un costo diario de \$ 50.00 incluyendo jornal de | tracto- |
| rista, amortización, combustible, desgaste, etc.) | \$125.00 |
| Jornal plantadores (600 plantas diarias a \$24.00) | \$ 80.00 |
| Jornales cuidados post-plantación | \$ 20.00 |
| Transporte de las plantas a la plantación | \$ 4.00 |
| Gastos generales (Capataces), (equipo, dirección, etc.) | \$ 4.00 |
| mon it. | A200 |
| TOTAL: | \$329.00 |
| 2) <u>Plantación en pozo abierto con pica gallega</u> | |
| 2000 Pinos a 3 40.00 el millar | \$ 80.00 |
| 20% reposicion | \$ 16.00 |
| Jornal plantadores 400 plantas diarias, 5 jornales a \$24.00 | \$120.00 |
| Jornales cuidados post-plantación | \$ 20.00 |
| Transporte de las plantas ala plantación | \$ 4.00 |
| Gastos generales | \$ 4.00 |
| TOTAL: | \$244.00 |

Valor tierra: \$ 700.00 la Há.

Costo de una Há. plantada: a) \$700.00 + \$384.00 = \$1.084

b) \$700.00 + \$329.00 = \$1.029

c) \$700.00 + \$244.00 \(\text{\$ \$ 944.00} \)

Este año se va a realizar una forestación de aproximadamente 250 Has. De esta superficie el 40%, o sea 100 Has. se efectuará sobre tierra arada, otro 40% con tractor y pecera y el restante 20 % con pica gallega.-

(Aunque el costo de la plantación con esa herramienta sea más bajo, todavía no se le usa en gran escala).-

De esta manera podemos colcular el costo de plantación en las siguientes cantidades:

100 Has. a 3 384.00 la Ha. \$ 38.400.00

100 Has. a 329.00 le Ha. 3 32.900.00

50 Ras. a \$ 244.00 la Ha. \$ 12.200.00

TOTAL COSTO PLANTACION \$ 83.500.00

Debemos tener en cuenta que se dispone de un equipo de 20 plantadores, que plantan de promedio 600 plantas disrias cada uno. Es decir que por día se hace la plantación de unas 12.000 plantitas...

Flantando como ya dijimos a una densidad de 2 mts. por 2,5 mts. es decir 2.000 plantas por Ha., se puede reslizar la total forestación de 250 Has. en unas 40 jornadas de labor, con una plantación total de 500.000 árboles.-

Fsta es la labor que se realiza actualmente con perconal del establecimiento. Pero como ya se ha mencionado, debido al cubsidio otorgedo a las plantaciones forestales esteraño se resolvió contratar plantación a empresas ajenas a un precio de 0.28 la planta plantada, pues es indudable que de esta forma ganaremos un año de cualquier manera, o dicho en términos forestales por lo menos 10 m³ por Ha./año.-

El sistera de pica gallega se efectúa en las partes más agrestes, pues en esos lugares es muy difícil utilizar otro sistema.

_antación en Celulosas del Uruguay S.A..-






Obreros plantando sobre tierra arada y rastreada, con pala Michigan.

(Nótese el gran tamaño de las plantas de P.insignis, que aunque parecen excesivamente grandes para plantarse, se obtiene un excelente porcentaje de plantas prendidas).-







P.insignis de un año de plan tados.-

forcincion:

pietaria el mismo tiene la firme intención de explotarlo en forma racional, estableciendo las industrias que sean necesarias en ese momento. Es decir que luego de comenzados los primeros ralcos y podas se procederá a la incorporación de los distintos rabros de pre-elaboración de los productos forectales destinados a la industria.-

los renglones que se anexarén seran los siguientes:

- a) Felamiento de la madera.-
- b) Almacenaje y desecación .-
- c) Aserradero.-
- d) Fletes .-

Todos estos rubros serán a no dudarlo, fuente de abun dante trabajo que se suasrán a los trabajos de mantenimiento, como ser:

- a) Ferconal de defensa contra imcendios .-
- b) Cualrilles de conservación (es necesario un hombre cada 60 Más.)
- c) " aserraderos, etc.

INVENTARIO FORESTAL >-

Bosque : Solimar

Especie: Pino insignis

Operador : O. Abaracón , R. Pijuán , L. Rolfo

Fecha: 27/X/60

Superficie: 3235,50 m²

Densidad de plantación : 3 x 2

Se realizó el inventario de un macizo de P. insignis, en una propiedad del Sr. E. Colombino, en el Em. 24 de la carretera Interbalmearia.-

Se trata de un bosque de 10 años de edad, asentado sobre suelo franco arcilloso, bordeado de cortinas de Populus nivea, Acacia negra y Cipreses lambertiana.

Se tomeron los diámetros de todos los árboles utilizando a este fin el compás forestal; las alturas fueron apreciadas
con el ipsometro a los efectos de calvular con estos datos el volumen aparente. Las alturas de los árboles de las dos primeras filas de todo el perímetro del bosque fueron despreciadas pues no
se considera que puedan dar una imagen real del valor maderero del
macizo.-

De cada diámetro se tomaron tres alturas de las siguientes categorías de árboles: dos alturas de árboles que estuvieran en los extremos y una altura correspondiente a un árbol situado en el centro del macázo.

Con los datos proporcionados por esta mensura se logra tener el volumen aparente de madera. Luego para hallar el volumen real se procedió a voltear dos árboles de alturas promedio del monte en estudio (en nuestro caso se realizó la tala de dos ejemplares: uno de diámetro de 18 cms. y otro ejemplar de D.A.P. de 24 cms.).-

Con el apec de estos árboles se procedióm a tomar cada metro lincal el diámetro correspondiente, para calcular el volumen real de los árboles promedios del monte.-

Luego de calculados los volumenes reales y aparentes, se procede por cociente entre ambos, a determinar el coeficiente mórfico del monte en particular.

Volumen Real - Coeficiente Morfico

Una vez hallado el Coeficiente Mórfico para este macizo multiplicando el mismo por el Volumen Real hallamos el cubaje total del monte.-

Tipo de planilla de campo usada:

| D.A.P.(cms.) | Especie (P. insignis) | tota por a | | Altura | Altura pro- medio por cat. |
|--------------|--------------------------|---------------|--------|-----------|-------------------------------|
| - de 10 🖾 | ⊠ 1: | 25 | | | |
| 10 | | 10 | 2.2 | 2.00 C.6. | 50 4.25 |
| 12 🖾 | \Box | 16 | ė.6.7 | ãoo.∂.0oï | .7.00 6.57 |
| 14 | | 19 | E.7.5 | 6.703 | .5.50 5.57 |
| 16 🔀 | 図. | 21 | H.8.0 | :00.8.00∃ | .6.00 7.33 |
| 18 🔀 | 図口 | 27 | B.11.0 | 00.7.00E | .10.009.33 |
| 20 🔀 | 図 図: | 33 | E.10.0 | 00.7.60B | .9.00 8.37 |
| 22 🔀 | A C | 28 | E.8.00 | €.5.40 | .5.40 7.27 |
| 24 🖾 | | 28 | E.10.0 | 00.9.00B | .10.009.67 |
| 26 🔀 | otin | 19 | E.10.c | 00.12.00 | E.10.00 10.67 |
| 28 | | 7 | E.9.50 | 0.9.50B.1 | 10.00 9.67 |

| D.A.P. (ems.) | Especie (P.insignis) | Total por cat | Altura • | | promedio cat. |
|---------------|-------------------------|---------------|-----------------|---------|---------------|
| 30 | oxtimes . | 11 | E.10.00C.11.00E | .8.60 | 9.87 |
| 32 | Γ. | 6 | E.9.00 C.9.00 E | .10.00 | 9•33 |
| 34 | | 1 | E.9.00 C.10.00E | .10.00 | 9.67 |
| 36 | | 3 | E.12.00 C.12.00 | E.12.00 | 12.00 |
| | Total: | 254 á: | rboles | | |

Obtenidos estos datos, se procede a hallar el Volumen aparente utilizando la siguiente fórmula:

3.1416 x R² x Altura promedio x Nº de árboles = Volumen aparente

1) Se calcula en primer lugar el volumen aparente del árbol.-

$$3.14 \times 0.05^2 \times 4.25 \times 10 = 0.333525 \text{ m}^3$$

$$3.14 \times 0.06^2 \times 6.57 \times 16 = 1.188276$$
 "

$$3.14 \times 0.07^{2x} 5.57 \times 19 = 1.628300$$

$$3.14 \times 0.08^2 \times 7.33 \times 21 = 3.091277$$

$$3.14 \times 0.09^{2x} 9.33 \times 27 = 6.407078$$

$$3.14 \times 0.10^2 \times 8.87 \times 33 = 9.191095$$

$$3.14 \times 0.11^2 \times 7.27 \times 28 = 9.430848$$

$$3.14 \times 0.12^2 \times 9.67 \times 28 = 12.242692$$

$$3.14 \times 0.13^2 \times 10.67 \times 19 = 6.171760$$
 *

$$3.14 \times 0.14^2 \times 9.67 \times 7 = 4.152375$$

$$3.14 \times 0.15^2 \times 9.87 \times 11 = 7.670470$$
 "

$$3.14 \times 0.16^2 \times 9.33 \times 6 = 4.499838$$

$$3.14 \times 0.17^2 \times 9.67 \times 1 = 0.879414$$

$$3.14 \times 0.18^2 \times 12.00 \times 3 = 3.662496$$

Volumen Aparente por árbol:

```
3.14 \times 0.05^2 \times 4.25
                         = 0.0333625 \text{ m}^3
3.14 \times 0.06^2 \times 6.57
                          = 0,0742672
3.14 \times 0.07^{2x} 5.57
                          = 0,0857000
3.14 \times 0.08^2 \times 7.33
                          = 0,1472036
3.14 \times 0.09^2 \times 9.33 = 0.2372992
3,14 \times 0,10^2 \times 8.87
                         = 0,2785180
3.14 \times 0.11^2 \times 7.27
                          = 0.2762163
3.14 \times 0.12^2 \times 9.67
                          = 0,4372387
3.14 \times 0.13^2 \times 10.67
                         0,5662142
3.14 \times 0.14^2 \times 9.67
                         = 0,5951304
3.14 \times 0.15^2 \times 9.87 = 0.6973155
3.14 \times 0.16^2 \times 9.33 \approx 0.7499827
3.14 \times 0.17^2 \times 9.67 = 0.8775138
3.14 \times 0.18^2 \times 12.00 = 1.2208320
```

Para hallar el Volumen Real se apearon dos árboles.

Volumen Real árbol 18 cms. de diámetro:

| ler. | metro | = | 20 | CH8. | Diámetro | $3.14 \times 0,100^2 \times 1 = 0,031400 \text{ m}^3$ |
|------|-------|---|----|------------|----------|---|
| 20. | n | = | 17 | 12 | ŧŧ | $3.14 \times 0.085^2 \times 1 = 0.022686$ " |
| 3er. | Ħ | = | 15 | 13 | n | $3.14 \times 0.075^2 \times 1 = 0.017662$ " |
| 40. | n | = | 14 | 77 | 11 | $3.14 \times 0.076 \times 1 = 0.015386$ " |
| 50∙ | Ħ | = | 13 | 11 | n | $3.14 \times 0.065^2 \times 1 = 0.013266$ |
| 60• | n | = | 12 | n | n | $3.14 \times 0.060^2 \times 1 = 0.011304 $ |
| 70. | tt. | = | 10 | 25 | Ħ | $3.14 \times 0.050^2 \times 1 = 0.007850 *$ |
| 80. | n | = | 9 | . 11 | 93 | $3.14 \times 0.045^2 \times 1 = 0.006358$ " |
| 90. | ŧŧ | = | 8 | ! 7 | #1 | $3.14 \times 0.040^2 \times 1 = 0.005024$ |
| | | | | | | Total: 0,130936 m |

Otros Datos:

```
100. metro = 6 cms. Diámetro 3.14 \times 0.030^2 \times 1 = 0.002826 \text{ m}^3
110. " = 5 " " 3.14 \times 0.025^2 \times 1 = 0.001962 \text{ m}^3
120. " = 4 " " 3.14 \times 0.020^2 \times 1 = 0.001256 \text{ m}^3
130. " = 2 " " 3.14 \times 0.010^2 \times 1 = 0.000314 \text{ m}^3
```

(1) Hasta 8 cms. de diámetro se considera la altura útil.-

Altura útil: 9.00 m.

Volumen Real árbol 24 cms. de diámetro:

| ler. | metro | = | 24 | cms. | Diámetro | $3.14 \times 0,120^2 \times 1 = 0,045216 \text{ m}^3$ |
|------|-------|---|----|-----------|----------|---|
| 20. | n | = | 22 | 87 | 11 | $3.14 \times 0.110^2 \times 1 = 0.037994$ |
| 30. | 11 | = | 20 | H | 17 | $3.14 \times 0,100^2 \times 1 = 0,031400$ |
| 40. | 11 | = | 18 | Ħ | n | $3.14 \times 0.090^2 \times 1 = 0.025434$ |
| 50• | ** | = | 17 | 67 | 53 | $3.14 \times 0.085^2 \times 1 = 0.022686$ |
| 60. | R | = | 16 | n | Ħ | $3.14 \times 0.080^2 \times 1 = 0.020096$ |
| 70. | u | = | 15 | 13 | a | $3.14 \times 0.075^2 \text{xl} = 0.017662 ^{\circ}$ |
| 80. | 11 | = | 12 | 17 | | $3.14 \times 0.060^2 \times 1 = 0.011304$ |
| 90. | 17 | = | 11 | 11 | 68 | $3.14 \times 0.055^2 \times 1 = 0.009498$ |
| 100. | π | = | 10 | Ħ | H | $3.14 \times 0.050^2 \times 1 = 0.007850$ |
| llo. | τι | = | 8 | 73 | | $3.14 \times 0.040^2 \times 1 = 0.005024$ |
| | | | | | | Total: 0,234164 m ³ (1) |

Altura útil: 11 metros

(1) Hasta 8 cms. se considera la altura útil .-

Otros Datos:

Coeficiente Mórfico = $\frac{0.130936}{0.237299}$ 0.55 Arbol 18 cms. Diáme tro

Coeficiente Mórfico $= \frac{0.234164}{0.437238} = 0.533$ Arbol 24 cms. Diáme -

Coeficiente Mórfico promedio: $\frac{0.55 + 0.53}{2} = 0.54$

Obtenido el Coeficiente Mórfico promedio, se procede a hallar el volumen real por categorías:

Volumen Real por categorías:

 $0,333625 \times 0,54 = 0,1801575 \text{ m}^3$

 $1,1882764 \times 0,54 = 0,6416692$

 $0,628300 \times 0,54 = 0,3392820$

 $3,091277 \times 0,54 = 1,6692895$ "

 $6,407078 \times 0,54 = 3,4598221$

 $9,191095 \times 0,54 = 4,9631913$ "

 $9.430848 \times 0.54 = 5.0926579$

 $12,242692 \times 0,54 = 6,6110536$

 $6.171760 \times 0.54 = 3.3327504$

 $4,152375 \times 0,54 = 2,2422825$

 $7,670470 \times 0,54 = 4,1420538$

 $4,499838 \times 0,54 = 2,4299005$

 $0.879414 \times 0.54 = 0.4748835$

 $3,662496 \times 0,54 = 1,9779478$ "

Se deduce entonces que de una superficie de 3235,50 m² se ha lo -

^{70,549446} \pm 0,54 = 38,0967008 m^3

grado una producción de 38,0967 m³ en 10 años , que referido a rendimiento por Ha. dería una producción de 117,2025 m³ ,lo que arroja un incremento anual por Ha. de 11,720 m³ , cifra muy indicada para esta especie forestal en un suelo de las características ya enunciadas.—

INVENTARIO FORESTAL .-

Bosque: Parque Nacional Franklin D. Roosevelt

Especie: Taxodium Distichum

Operador: O. Abaracón , R. Pijuán , L. Rolfo

Fecha: 15/1/61

Superficie: 727,12 m²

Densidad de plantación: 3 x 2

Se utilizó para este inventario forestal la misma técnica que para el anterior, tomándose diámetros y alturas a los efectos del cálculo del volumen aparente con los aparatos compás forestal e ipsometro.

Se procedió al apeo de un árbol de 36 cms. de diámetro, procediéndose a su medición a los efectos de obtener el volumen real.-

(1) Tipo de planilla usada en este inventario. -

| D.A.P.(cms.) | Especie (T. distichum) | Total por cat. | Altura diam.12 | Altura diem.7 |
|--------------|---------------------------|----------------|-------------------|------------------|
| 12 | * • | 2 | 2.00 | 4.00 |
| 14 | * • | 2 | 2.00 | 4.00 |
| 16 | | 2 | 2.50 | 4.60 |
| 18 | • • | 2 | 5 . 50 | 7.00 |
| 20 | | 2 | 5. 50 | 7.50 |
| 22 | • • | 3 | 6.50 | 7.50 |
| 24 | • Æ | 3 | 8.50 | 12.00 |
| 26 | | 2 | 8.50 | 13.00 |
| 28 | • | 5 | 9.00 | 13.00 |

| D.A.P. (cms.) | Especie (T. distichum) | Totalpor | r altura diaml2. | altura diam.7 |
|---------------|---------------------------|----------|---------------------|------------------|
| 30 | | 6 | 9.00 | 14.00 |
| 32 | • • | 4 | 9.00 | 14.50 |
| 34 | | 2 | 9.00 | 14.5o |
| 36 | • | 1 | 9.00 | 15.00 |
| 38 | : . | 3 | 9.00 | 15.00 |
| 40 | • • | 4 | 10.00 | 15.50 |
| 42 | | 0 | _ | _ |
| 44 | <u>#</u> | 1 | 10.00 | 15.50 |
| 46 | | 1 | 11.00 | 16.00 |
| | Total: | 45 | árboles | |

Se trata de un monte que no ha sido podado nunca, asentado sobre un terreno que era en el pasado un vivero forestal.-

Se tomaron muestras de suelo, extrayéndose a los costados del monte, a cuatro metros hacia afuera pues el macizo está planta do en montículos.-

Obtenidos los datos de la planilla precedente, se procede a hallar el Volumen Aparente utilizando la siguiente fórmula :
3.1416 x R² x Altura promedio = Volumen Aparante/árbol
Volumen Aparente/árbol x No. de árboles por categoría = Volumen
aparente por categoría.-

```
3.14 x 0,11<sup>2</sup>x 7.50 = 0,284955 m<sup>3</sup>
3.14 x 0,12<sup>2</sup>x 12.00 = 0,542592 "
3.14 x 0,13<sup>2</sup>x 13.00 = 0,689858 "
3.14 x 0,14<sup>2</sup>x 13.00 = 0,800072 "
3.14 x 0,15<sup>2</sup>x 14.00 = 0,989100 "
3.14 x 0,16<sup>2</sup>x 14.50 = 1,165568 "
3.14 x 0,17<sup>2</sup>x 1450 = 1,315817 "
3.14 x 0,18<sup>2</sup>x 15.00 = 1,526040 "
3.14 x 0,19<sup>2</sup>x 15.00 = 1,700310 "
3.14 x 0,20<sup>2</sup>x 15.50 = 1,946800 "
3.14 x 0,21<sup>2</sup>x
3.14 x 0,22<sup>2</sup>x 15.50 = 2,355628 "
3.14 x 0,23<sup>2</sup>x 16.00 = 2,657696 "
```

Multiplicando estos valores por el № de árboles por categorías se obtiene el volumen aparente total.-

```
0,045216 \text{ m}^3 \text{x}2 = 0,090432 \text{ m}^3
0,061546 \text{ " x 2} = 0,123092 \text{ " }
0,092441 \text{ " x 2} = 0,184882 \text{ " }
0,178038 \text{ " x 2} = 0,356076 \text{ " }
0,225500 \text{ " x 2} = 0,451000 \text{ " }
0,284955 \text{ " x 3} = 0,854865 \text{ " }
0,542592 \text{ " x 3} = 1,627776 \text{ " }
0,689858 \text{ " x 2} = 1,379716 \text{ " }
0,800072 \text{ " x 5} = 4,000360 \text{ " }
0.989100 \text{ " x 6} = 5.934600 \text{ " }
```

```
1,165568 x 4 = 4,662272 m<sup>3</sup>
1,315817 x 2 = 2,631634 "
1,526040 x 1 = 1,526040 "
1,700310 x 3 = 5,100930 "
1,946800 x 4 = 7,787200 "
2,355628 x 1 = 2,355628 "
2,657696 x 1 = 2,657696 "

Total: 41,724199 m<sup>3</sup>

Para hallar el Volumen Apa:
3.14 x 0,06<sup>2</sup>x 2.00 = 0,022
```

 $3.14 \times 0.22^2 \times 10.00 = 1.519760$ "

 $3.14 \times 0.23^2 \times 11.00 = 1.827166$

Total: 41.724199 m³ = Volumen Aparente a 7 cms. diámetro/al tura útil.-Para hallar el Volumen Aparente con altura = 12 cms./diámetro útil $3.14 \times 0.06^2 \times 2.00 = 0.022608 \text{ m}^3$ $3.14 \times 0.07^2 \times 2.00 = 0.030772$ $3.14 \times 0.08^2 \times 2.50 = 0.050240$ $3.14 \times 0.09^2 \times 5.50 = 0.139887$ $3.14 \times 0.10^2 \times 5.50 = 0.172700$ $3.14 \times 0.11^2 \times 6.50 = 0.246961$ $3.14 \times 0.12^2 \times 8.50 = 0.384336$ $3.14 \times 0.13^2 \times 8.50 = 0.451061$ $3.14 \times 0.14^2 \times 9.00 = 0.553896$ $3.14 \times 0.15^2 \times 9.00 = 0.635850$ $3.14 \times 0.16^2 \times 9.00 = 0.723456$ $3.14 \times 0,17^2 \times 9.00 = 0,816714$ $3.14 \times 0.18^2 \times 9.00 = 0.915624$ $3.14 \times 0.19^2 \times 9.00 = 1.020186$ $3.14 \times 0.20^2 \times 10.00 = 1.256000$ $3.14 \times 0.21^2 \times -----$

Multiplicando por el Nº. de árboles de cada categoría, se obtiene el Volumen Aparente Total.-

```
0.022608 \text{ m}^3 \times 2 = 0.045216 \text{ m}^3
0.030772 " \times 2 = 0.061544 "
0,050240 " x 2 = 0.100480 "
0,139887 " \times 2 = 0,279774 "
0.172700 " x 2 = 0.345400 "
0,246961 " \times 3 = 0,740883 "
0.384336 " x 3 = 1.153008 "
0.451061 " \times 2 = 0.902122 "
0.553896 " x.5 = 2.769480 "
0,635850 " \times 6 = 3,815100 "
0.723456 " x 4 = 2.893824 "
0.816714 " x 2 = 1.633428 "
0,915624 " \times 1 = 0,915624 "
1.020186 \text{ "} \text{ x } 3 = 3.060558 \text{ "}
1,256000 \text{ "} \times 4 = 5,024000 \text{ "}
1,519760 " \times 1 = 1,519760 "
1,827166 \text{ " } \text{ x } 1 = 1,827166 \text{ "}
```

Para calcular el Volumen Real se apeó un árbol de 36 cms. de diá - metro procediéndose a determinar los valores siguientes:

3.14 x 0,18² x 1 = 0,101736 m³
3.14 x 0,17²
$$\dot{x}$$
 1 = 0,090746 m
3.14 x 0,16² x 1 = 0,080384 m

```
3.14 \times 0.15^2 \times 1 = 0.070650 \text{ m}^3
```

$$3.14 \times 0.14^2 \times 1 = 0.061544$$

$$3.14 \times 0,13^2 \times 1 = 0.053066$$

$$3.14 \times 0,12^2 \times 1 = 0,045216$$
 "

$$3.14 \times 0.11^2 \times 1 = 0.037994$$

$$3.14 \times 0.10^2 \times 1 = 0.031400$$
 "

$$3.14 \times 0.09^2 \times 1 = 0.025434$$

$$3.14 \times 0.08^2 \times 1 = 0.020096$$

$$3.14 \times 0.06^2 \times 1 = 0.011304$$
 "

$$3.14 \times 0.05^2 \times 1 = 0.007850$$

$$3.14 \times 0.035^2 \times 1 = 0.003846$$

Total: 0,641266 m³ Volumen Real altura útil = 7 cms./

Volumen Real altura útil = 12 cms. / diámetro

Total: 0,637262 m³

Largo del árbol de 36 cms. D.A.P. hasta 12 cms. diámetro altura útil:12 mt

Largo del árbol de 36 cms. D.A.P. hasta 7 cms. diámetro altura útil:14 m.

$$\frac{0.641266 \text{ m}^3}{1.526040 \text{ m}^3} = 0.42$$

Coeficiente Mórfico promedio:0,68 + 0,42 = 0,55

Cubaje total del monte a altura útil 7 cms./diámetro: $41,724199 \text{ m}^3 \times 0,55 = 22,948310 \text{ m}^3$.

Superficie del macizo: 727,12 m2 .-


Para calcular la superficie de este monte se midieron los lados del triángulo y luego con tres miras y la cinta métrica se formaron dos ángulos rectos por el método de 3 - 4 - 5 - Se to mó el ángulo recto a una distancia exterior del monte de 4,6 omts. (Ver plano adjunto)



Medición de diámetros (calibre forestal)



Regla usada para determinar alturas (método del ipsómetro)



Especies Taxodiam distinction

Para e: Farque F. D. Researcht

Sup total: 727, ma

Menejo de montes.- (Pinus radiata.-)

Duede decirse, sin lugar a dudad, que el manejo de un bosque exótico comienza ya inmediatamente desde que terminan las operaciones de plantación del mismo.

En todos los planeamientos previos a la instalación de un bosque debe tenerse muy en cuenta la especie seleccionada para la plantación, sus características de crecimiento y vegetación, su turno de explotación para cada tipo de suelo a plantarse, etc, a los efectos de conocer en el mayor grado posible, el resultado de las sucesivas etapas de su posterior manejo. También se tendrá muy en cuenta el mercado disponible para el producto obtenido, ya sea de las cosechas parciales o de su cosecha totall

En las primeras etapas, cuya variación en tiempo está sujeta a las distintas especies forestales y a su turno de explotación, se tendrá especial cuidado de mantener al bosque en crecimiento libre de enemigos que lo puedan perjudicar, como roedores,
hormigas, ganados, etc., así como también se tratará, aunque en
nuestro medio esto no se realiza, de mantener el área del futuro bosque libre de malezas, mediante carpidas u otros trabajos
culturales. En cualquier establecimiento rural en el que se practique una forestación racional, se deberá mantener durante todo
el año un personal de cuidado y conservación del monte, que se
ocupe de todas las operaciones de mantenimiento del mismo.

Así se deberá, luego de los primeros años de crecimiento del macizo, procederse a los sucesivos raleos, que variarán con la especie plantada, con la densidad de plantación, y también según el lugar o sitio forestal que se haya elegido para su implantación. En cuanto al clima, puede decirse que este factor no ofrece tantas variaciones como los anteriores, especialmente para nuestro país.

La poda de los árboles, en aquellas especies que no poseen poda natural, como lo es el Pino insigne, debe tener gran importancia en el manejo de los montes, debido a que contribuye en forma notable a la obtención de una madera de superior calidad, desprovista de nudos.

Finalmente se llegará entonces a la cosecha del producto maderero, que presentará una mejor calidad en bosques bien manejados, y que habrá ya redituado en gran parte el dinero invertido en su producción y cuidado, a través de las cosechas parciales provenientes de los primeros raleos.

Raleo en linus radieta.

El bosque que nos ocupa, que es un macizo de Pinus radiata (P.insignis) situado en el balneario Solymar, sobre un suelo franco- arcilloso, ha sido plantado a una densidad de 3 m. x 2 m. obteniendose un bajo porcentaje de prendimiento para esta especie, ya que el mismo fué de un 70 %. Es común para nuestro país un prendimiente del 90 % en plantaciones bien realizadas y en épocas oportunas, con plantas de tamaño, vigor y sanidad ideales.

A esta densidad, que significa plantar 1650 árboles/Ha., se logró un promedio por hectárea de 1155 plantas prendidas al año de efectuada la plantación. Esta cifra es desde todo punto de victa baja para el normal desarrollo en los primeros años del regimen fustal de esta especie. Se preconiza la plantación de P. insignis a razón de 2500 árboles/Ha., o sea a una distancia entre plantas de 2 m. x 2 m., o por lo menos a una distancia de 2,5 m x 2,5 m. o sean 1600 árboles/Ha. Estas densidades, con un alto porcentaje de plantas prendidas, hacen que el regimen fustal se vea favorecido lográndose árboles derechos, de buena altura, de poco ramaje lateral, pues se establece una competencia favorable en busca de la luz principalmente. Esto hace que luego sea posible la elección de los fustes en los sucesivos ralcos.

A este bosque de l'ino insigne en Solymar, que actualmente tiene diez años de edad, se le ha practicado hace ya unos tres años un raleo de limpieza con el objeto de extraer los árboles secos, enfermos, retorcidos, de dos flechas, los excesivamente dominados, etc. Este raleo llegó a extraer el 32 % de los árboles existentes, dejando un promedio de 787 ejemplares por hectárea.

De una superficie de 3235,50 m², que se halla cubierta actualmente per 254 árbeles, se va a proceder a realizar ahora un raleo de los fustes de 16 cms. D.A.P. y menores que este diámetro. Estos constituyen, como lo documenta el trabajo de inventario realizado, 91 ejemplares, que representan a su vez el 35,8 % del total de árboles del predio. En un cubaje total de 38 m³ 096 estos árboles tienen un volumen de 3 m³ 370 o sea un 8,8 % del total.

Sin embargo, se recomienda no extraer en un sólo raleo más del 30 % del total de fustes, pues parece ser que la plantación queda muy abierta y los árboles más finos quedan demasiado expuestos a la acción del viento y del sol. En general no se puede aplicar en esta operación un critorio matemático, sino que el silvicultor debe situarse en cada caso determinado con critorio forestal.

La finalidad de los raleos la podemos sintetizar en la forma siguiente: a) he debe mantener al monte en su condición óptima de crecimiento, impidiendo que este sea detenido por una
excesiva densidad. b) Es necesario quitar los árboles causantes.
de perturbaciones al normal desarrollo del bosque, como los torcidos, enfermos, etc., y al mismo tiempo permitir a los mejores
ejemplares que dispongan del espacio vital para su mejor crecimiento. Es así que se dben ralear los fustes clasificados como
suprimidos, por estar secos, los llamados árboles dominados, y
según la densidad en que se encuentren los fustes dominantes,
también deberán quitarse algunos árboles co- dominantes, dejándose otros de esta categoría en lugares donde se prevea su buen
desenvolvimiento.

De estos árboles que procederemos a ralear en el bosque que nos ccupa, se destinarán aquellos de 16 ems.D.A.D. para la obtención de algunas tablas, pero en general todo este raleo estará destinado a la obtención de madera para pulpa, que se venderá a la planta industrializadora de la firma C.I.C.S.S.A. se espera poder efectuar otro raleo a este monte a una edad de 16 años, es decir dentro de seis años.

Los técnicos del Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas para montes de F. incignis de buen crecimiento efectuar cuatro ralecs importantes:

ler. raleo: 6 - 7 años de edad.-

20. noleo: 10-11 " " "

30. raleo: 14 -15 " "

40. roleo: 18 -19 " " "

Recomiendan también fijar especial atención en las copas de los árboles para proceder a su raleo, pues " es el follaje quien produce la alimentación del árbol". Preconizan que " en bosques de 12 - 15 años de plantados que no hayan sido raleados, se deberá tener mucho cuidado al efectuar esta operación, realizando los raleos en forme sucesiva, quitando cada 2 - 3 años un 10 - 15 % hasta lograr la densidad buscada.

Las herramientas que recomiendan para estos trabajos son las siguientes: 1) Hacha arbustera 2) hacha liviana de dos filos 3) serrucho de arco 4) diversas herramientas para quitar la corteza de los árboles y también diferentes tipos de cuñas.

la poda en P. insignis .-

El rinus radiata (F. insignis) como ya dijimos, es una de las especies forestales que no posee poda natural. A los efectos de la obtención de una madera de óptima calidad, libre de nudos, es completamente necesaria la poda de esta especie en momentos y condiciones oportunas, y con una buena técnica que nos conduzca a positivos recultados.

Esta operación de la poda debe realizarse cuando los árboles son todavía jóvenes. Se sostiene que debe realizarse la primera poda a los 6 a 7 años de edad, y una segunda poda a los 10 u 11 años.

La poda debe efectuarse de abajo hacia arriba, es decir comenzando por las ramas que se encuentram más cercanes a la tierra, y continuando luego por las ramas superiores. El I.I.C.A. recomienda no podar más arriba de 8.30 mts.

Te deben utilizar para realizar la poda diversas herramientas que variarán teniendo en cuenta el diámetro y la posición de las ramas a sacer. Se utilizan por lo general serruchos de distintos tipos y tijeras de podar para las ramas de poqueno diámetro. Se estima que resulta inconveniente el uso del hacha pues esta herramienta deja generalmente pedazos de ramas sobresalientes del tronco que son indeseables. Se debe tratar siempre de realizar el corte de la rama junto al tronco, para evitar que queden estas puntas salientes. En el caso de que las ramas sean muy pesedas, y que se esté frente a la posibilidad de que se desgarre el árbol al cortar la rama, debe en primer lugar proticarse un corte más separado del tronco, y una vez caída la rama, realizar otro corte junto al tronco.

El uso de escaleras es indicado para las ramas superiores, que se podarán una vez quitadas las ramas inferiores. En el caso de que el árbol presente dos troncos divididod, debe quitarse el de menor diámetro y más torcido.

se recomienda especialmente no realizar la poda de ejemplares demasiado jóvenes así como tampoco podar árboles a una altura mayor de 8.30 mts., pues se les quitaría así mucho follaje
que es vital para el desarrollo de la planta. En el caso de árboles jóvenes sería inconveniente también la extracción de mucho follaje.

Las ramas que resultan de los trabajos de la poda, no es necesario quitarlas del érea del bosque, pero sí deben desgajarse lo más posible, a los efectos de facilitar su descomposición y disminuír los peligros de incendios que pudierna provocarse por la acumulación de ramas y hojas secas.

Debe haberse raleado ya la plantación antes de comenzar a podar la misma, pues se dispondró así, además do mayor comodidad y limpieza para efectuar esta operación, de los árboles más aptos para ser sometidos a la poda.

Lebe tenerse my en cuenta que los fustes mejores que no se ralearán, serán los que reembolsen mejor el dinero invertido en la realización de la poda.

El Inst. Interamericano de Ciencias Agrícolas, recomienda las siguientes épocas, número de árboles a podar por hotárea y fracción de altura del árbol a que se debe podar, para buenas plantaciones de P.insignis:

| PODA | AÑOS | No. de árboles a podar por Ha. | Fracción de altura a que debe podarse |
|------|---------|-----------------------------------|--|
| la. | 6 - 7 | 1200 | 1/3 |
| 2e. | 10 - 11 | 700 | 1/2 |
| 3a. | 14 - 15 | 500 | 1/2 6 8.30 mts. |





Efectos del fuego sobre un monte de P. insignis (Balneario Solymar. - Edad: 5 años. -)

VI) Consideraciones generales sobre un plan director de forestación

En el actual estado deficitario en materia fores tal en que se encuentra nuestro territorio, en que se hace de imperativa necesidad la plantación de bosques que tiendan a acrecentar nuestras riquezas agropecuarias, es de gran importancia realizar es tas plantaciones de acuerdo a planes racionales, concebidos y realizados con ajustada precisión para no malgastar el tiempo ni el dine ro invertidos en esta empresa.—

Se debe tener especialmente en cuenta, que el producto maderero que se pretende cosechar de un macizo forestal, de be estar constituído por el tipo de madera más conveniente o de mayor utilidad en el momento, según los objetivos de la forestación determinada, y que esa madera debe ser producida en corto período de tiempo, es decir que se tendrán que elegir especies de corto turno de explotación. Deberá esa madera ser obtenida mediante una buena técnica silvícola, para poder cosechar un producto de calidad, que como ya dijimos nos reembolse con creces el dinero y tiempo invertidos. Tenemos que buscar el logro de un mayor volumen de madera también, en igual cantidad de tiempo.—

Para esto entonces, no debe dejarse librado al azar ningún factor al hacer los planeamientos previos a la instalación de un bosque. El forestador tienela obligación de estudiar detenidamente cada punto del proyecto a realizar, teniendo especial cuidado en la elección del sitio forestal a plantar, las esencias forestales a utilizarse, mercado de las mismas, formas de producción el clima del lugar, la manera de realizar la plantación, y en general todos aquellos factores que pueden manejarse para lograr una me

rmonia en el bosque a crearse.-

economica.-

Sitios forestales: El primer factor a tener en cuen ta en todo Plan Director puede decirse que lo constituye el lugar donde se instalará el bosque. Se deberán tener presentes los factores siguientes respecto a este punto:

a) Estudio del suelo y subsuelo del área. En nuestro país, tenemos mucho territorio apto para la forestación. Llamamos "sitionforestal", al conjunto de factores edáficos, climáticos y biólógicos que hacen de una región o zona, un lugar apto para el establecimiento y cultivos de bosques en forma

Serán especialmente aptos para la forestación las dunas, serranías, bañados y aluviones, como también aquellos terrenos erosionados por distintas causas, y las"tierras cansadas", zonas que el deficiente manejo agrícola ha ido empotreciendo y donde las buenas facturas forrajeras han cedido paso a los pastos de inferior callidad, y en muchos casos, a las formas de desertización total. To dos estos lugares varían en cuanto a su "potencia forestal", es dee cir en cuanto a la capacidad de cada uno de desarrollar en más o en menos el crecimiento de las distintas esencias forestales, en diámetro y altura, en un período de años determinado. Se clasifica en cinco tipos distintos (Tal V), siendo el tipo I el mejor y el tipo V el de peor crecimiento para una especie dada. Fara cada uno de es tos sitios forestales deben elegirse cuidadosamente las especies appropiadas a ellos.

Elegido el sitio tendremos entonces que estudi-

diar a los efectos de ir luego a la selección de especies a plantar, todos todos los factores relativos a la constitución de las capas de sue-

En una extensión de campo de mediana superficie pueden entremezclarse una diversidad de horizontes A. B. y C que ha rán que las especies forestales a elegirse para una misma zona varien bastante de acuerdo a ellos. Así se deberá estudiar detenidamente el perfil del suelo y subsuelo practicando pozos de 1.50 m. a 2.00 m. de profundidad, a los efectos de poder observar racteristicas mas importantes de los distintos horizontes. Se tendrá en cuenta la textura y estructura de diferentes partes de la zona a forestar, se hará una estimación de los posibles niveles de napas de aguas subterráneas, factor muy importante en el desarrollo del futuro bosque, se estudiará el espesor de la capa arable si la hay, y se tendrá especial cuidado al determinar tembién la constitución química de los horizontes, a los efectos de conocer los elementos nutritivos con que cuenta cada suelo en particular. Es decir que al examen visual y fisico acompañará luego el analisis químico de cada uno de los suelos a forestar. Para esto se tendrá cuidado en tomar muestras representativas de las distintas areas del campo, sacando muestras de las partes de valle, de sierra, de bañados, etc., para proceder a su clasificación.

El estudio visual y analítico de los suelos nos permiten hacer la clasificación de los mismos en arcillosos, arcillo-humíferos, arenosos, etc., que facilita enormemente la tarea de la elección de especies a plantar.

b) Topografía y relieve.Otro factor a tener muy en cuenta en el planeamiento de un plan

Debe confeccionarse un plano con las diferentes alturas y curves de nivel de la extensión a forestarse, comprendiendo los accidentes geológicos que puedan presentarse, como cerros, cursos de agua, etc., las distintas pendientes que se originan, y las exposiciones al sol y a los vientos que se crean también debido a las diferentes ondulaciones que presente el campo. También en este aspecto se cuidará de realizar observaciones de la zona en general en la que se halla el campo, pues debemos también tener conocimiento de los campos vecinos, a los efectos de determinar la formación a que pertenece el campo en particular.

c) Caracteristicas climáticas:

El clima es otro de los factores que incidirán profundamente sobre el futuro bosque a lograrse. A pesar de que en nuestro país solamente hay en cuanto a zonas climaticas una evidente variación que la constituye el clima templado marítimo (que comprende la zona del paralelo 34 hacia el Sur, es decir la región costera), frente al clima normal delresto de la Rejública, que es el templado continental, es importante el estudio de los factores climaticos, y especialmente el estudio de los microclimas de cada región, que conducirán a diferentes comportamientos de las esencias forestales plantadas. Se tendrá que implantar la especie más indicada a cada habitat determinado, si se pretende lograr un crecimiento y desarrollo óptimo, e por lo menos normal, del bosque plantado.

Los factores climáticos más importantes a tener en cuenta para cada región dada son los siguientes:

- 1) La lluvia
- 2) La temperatura
- 3) Regimen de vientos

4) La luz

especies a plantar.

- 5) El granizo
- 6) Las heladas
- 7) Las seguias

Todos estos elementos contribuirán en distinto grado al crecimiento de las distintas especies forestales a elegir.

Una vez realizado un estudio completo de las características de la región, de su habitat natural, de su suelo y subsuelo, de su topografía y relieve, y de sus condiciones climatericas, así como también de las posibilidades de mercado para el producto a cosechar, en el bien entendido que nos referimos a una explotación económica del bosque, y no a la implantación de un macizo protec-

tor en sus diferentes usos, se debe proceder a la elección de las

Se debe efectuar una elección entonces cuando se está en poder de una serie de conocimientos que ayudarán a disminuir los riesgos de una elección equivocada. Hay que pensar que un bosque constituye una inversión de renta diferida, que puede luego de varios años de plantado recién dar muestras de un crecimiento deficiente o por lo menos mediocre de una especie cualquiera en una región determinada. También puede el crecimiento de un macizo producir verdaderos engaños, pues luego de un crecimiento y desarrollo en alturas y diámetros bueno en los primeros años, puede detenerse y permanecer estacionario o por lo menos por debajo de su crecimiento normal con la consiguiente pérdida de dinero y de tiempo.

Es decir entonces, que en la industria forestal no pueden ni deben tolerarse errores en la elección de especies

para un sitio determinado. Deberán las especies elegidas adaptarse plenamente a las condiciones ecologicas del lugar, y por el contrario, estas condiciones ecologicas deberán satisfacer las exigencias en habitat de las especies elegidas.

Estructuración del Plan Director.-

Una vez en perfecto conocimiento de los factores antes mencionades, y luego de haber realizado la elección de las diferentes especies para los distintos sitios forestales que puedan estar comprendidos en un área determinada, el forestador tendrá los elementos que lo llevarán a una plantación racional.

El Plan Director o "Master Plan" de un área a forestarse deberá entonces constar de los siguientes capítulos:

- 1) Plano de mensura del predio en el cual constarán las diferentes alturas del mismo, curvas de nivel, así como también sus accidentes geográficos.
- 2) Flano de distribución de diferentes tipos de suelos que puedan encontrarse.
- 3) Tratándose de extensiones grandes (por ejemplo en casos de planes nacionales), también deberá confeccionarse un plano de distribución de lluvias, heladas y otros factores climáticos.
- 4) Plano de proyecto de distribución de las diferentes especies a plantarse, localizando las especies que se
 plantarán en las zonas bajas, en las laderas, en los cerros, en
 las partes de bañados, en las zonas arenosas, etc., comprendiendo
 también la distribución de caminos principales, secundarios, cursos de agua, cortafuegos, que podrán ser los mismos caminos y cursos de agua, o también franjas sin árboles y debidamente conser-

vadas (limpias de malezas, breznales, ramas, etc.). Este plano puede también indicar la situación del recto de los elementos de la explotación, o confeccionerse a estos efectos un plano complementario. Estos elementos serán las áreas destinadas a viveros, el lugar para viviendas y galpones del personal, casas de administración, lugares para futuros aserraderos o plantas para pelamiento o extracción de pulpa de madera, etc. También los elementos de donde extraer agua para riego, molinos, tanques, bombas, pueden estar indicados.

5) Generalmente aparte del plano anterior se confecciona un plano individual de defensas contra incendios. En el mismo constan las diferentes secciones en que se divide la plantación a los efectos de la lucha contra posibles incendios, las defensas cortafuegos de que se dispone, caminos que servirán de acceso al personal hasta todos los lugares del bosque, la distribución de las atalayas de observación para los guardabosques, sistemas de comunicación con la central, y en general de todos aquellos factores que puedan contribuir a aminorar los riesgos de fuegos.

Se debe también realizar, una memoria del proyecto de plantación a efectuar, donde se describa detalladamente
las razones de la implantación de las diferentes especies en los
diferentes suelos, su posible turno de explotación, su manejo y
cosechas parciales, y fundamentelmente, ya que hablamos de la explotación economica del bosque, se detallarán los rendimientos y
usos del producto maderero a lograrse, teniendo para esto muy en
cuenta la existencia y demanda del mercado nacional e internacional, en la época actual y en el tiempo en que se espera obtener
la cosecha de este bosque.

Se deberá indicar también la forma de realizar las cosechas, tratando de que las mismas sean efectuadas en forma parcial y ordenada, de manera de poder mantener al bosque en explotación bien manejado por un periodo de tiempo dilatado.

En esta memoria se detallarán asimismo los costos de implantación de toda la explotación forestal, comprendiendo sus diversas partes, así como también los costos demantenimiento del establecimiento, como jornales, y alimentación del personal, gastos de viveros, interés de la tierra, amortización del capital invertido, atc. Se estimarán los rendimientos en madera y su comparación con el capital invertido a los efectos de probar la faz economica de este tipo de explotación agropecuaria. En los casos que los bosques sean implantados con fines también de protección, debe estimarse esta acción del bosque, que puede resultar de tanta o mas importancia que su explotación industrial.

Ensayo con producto herbicida-fungicida V.P.M.(Dupont) contra el Pamping pff y malezas en almácigos de Pinus radiata (P. insignis.-

Fecha: Agosto, 1960.-

Preparación de la tierra:

Agosto 1: Se trabajó la tierra a pala de puntear, encanterándose o cho parcelas de 1 mt. de ancho x 4 mts. de largo.-

Tratamiento con el producto:

Agosto 4.- Farcela N°.1: Se trató con 400 c.c. de producto. Se completó con agua la regadera de 18 lts. Se regó. Luego se volvió a regar de inmediato con tres regaderas más de agua para lograr la penetración eficaz del producto. (45 lts. más de agua).-

<u>Parcela N°.2:</u> Se trató con 200 c.c. siguiéndose el mismo procedimiento.-

<u>Farcela N°.3:</u> Se trató con 600 c.c. Se realizó igual procedimiento que para las anteriores.-

<u>Farcela N°.4:</u> Se trató con 300 c.c. efectuándose las mis mas operaciones que para las otras.-

No se cubren los canteros con lonas por no haber fuertes vientos.
<u>Agosto 19.-</u> Se trabajó la tierra a pala depuntear en los ocho cante
ros (quince diás después de aplicado el producto). No se realizó antes este trabajo por no permitirlo el estado de la tierra, que se en
contraba muy húmeda.-

Siembras.-

Setiembre 5: Se trabajó la tierra a pala. Luego se rastrillaron todos los canteros hasta lograr una buena preparación de la sementera Se sembró luego la semilla de Pinus radiata (P. insignis), dejando una distancia de 0,15 m. entre surco y surco y de o,ol entre semilla y semilla. Se sembraron así las ocho parcelas, haciendo cinco filas en cada una de ellas. Sembracas a esta distancia, se utilizaron 400 semillas por surco.-

Total de semillas sembradas en cada parcela : 400 x 5 = 2000 semillas
" " las ocho parcelas : 2000 x 8 =16.000
semillas

Germinación:

Setiembre 28: Aparecen las primeras plantitas.-

Octubre 3 : Practicemente han nacido todas las plantas (30 días

después de realizada la siembra) .-

Riegos :

Se efectuaron riegos en las siguientes fechas: Setiembre 27.-

Octubre 3.-

Moviembre 11.-

Análisis de semilla:

Especie: Pinus radiata

Syn. : P. insignis, P. Monterrey

Origen : Chile

Análisis de germinación:

Fecha de iniciación: 27/111/50

Fecha de germinación:12/ V /60

Facultad germinativa (a los 42 diás): 66%

Emergía germinativa (a los 28 días): 44%

Condiciones de análisis: 400 semillas en estufa de germinar(20-30°c.)

Análisis de pureza:

Grado de pureza total: 98%

Impurezas

: Alas menbranosas, granos partidos, materia iner

te.-

Valor utilitario : 64,68%

Junio 21, 1960

Ensayo de herbicida - fungicida --

Especie forestal tratada: Pinus radiata (P. insignis)

No. de parcelas :obho

Ensayo de orientación : Se adjunta croquis

Sistema de siembra : En filas simples

Producto de ensayo : V.P.M. (Dupont)

Cuidados culturales: Riegos solamente

Estado actual del ensayo:

Del recuento de plantas existentes en la actualidad (Octubre - Noviembre 1960) resulta:

| Promedio | por | fila | testigo: | 223 plantas |
|----------|-----|------|----------|-------------|
| 11 | 17 | 16 | tratada: | 222 " |
| | | | | (200 c.c.) |
| 17 | (1 | 11 | 11 | 228 plantas |
| | | | | (300 c.c.) |
| Ħ | 1) | 99 | ts : | 254 plantas |
| | | | | (400 c.c.) |
| п | 48 | Ħ | n : | 224 plantas |
| | | | | (600 c.c.) |

Malezas existentes:

El número de malezas anotadas hasta el 23 de Noviembre de 1960 son las siguientes:

Farcelas testigos (4 parcelas); 728 malezas

Parcelas tratadas (4 parcelas): 273 malezas

Frimer recuento de malezas. - Noviembre 23. 1960. -

Parcela Nº. 1 (400 c.c. V.P.M.)

Sonchus oleracea 1

Rumex sp. 1

Eragrostis neomexicana 2

Varias 5

Total: 9 malezas

Parcela Nº. 5 Testigo .-

Tréboles 3 Portulaca oleracea 2 Taraxacum officinalis 1 Eragrostis neomexicana 16 Varias 8 Sonchus oleracea 1 Galinsoja parviflora 3 Stellaria media 1

Total: 35 malezas

Parcela Nº. 2 (200 c.c.V.P.M.)

Sonchus cleracea 2
Eragrostis neomexicana 3

Varias 7

Total: 12 malezas

| Parcela Nº. 6 Testigo | - |
|-------------------------|-----------------|
| Trifolium repers | 1 |
| Medicago arabica | 3 |
| Matas rastreras | 2 |
| Sonchus pleracea | 1 |
| Portulaca oleracea | 2 |
| Eragrostis neomexicana | 4 |
| Varias | 1 |
| | - |
| Total: | 14 malezas |
| Parcela Nº. 3 (600 c.c | . V.P.H.) |
| Ulmus sp. | 2 |
| Sin reconocer | 1 |
| Eragrostis neomexicanal | 156 |
| Total:1 | 159 malezas |
| Parcela Nº. 7 Testigo | |
| Ulmus sp. | 6 |
| Artemisia verlotorum | 21 |
| Soncaus oleracea | 7 |
| Eragrostis neomexicana | 256 |
| Total: | 290 malezas |
| Parcela No. 4 (300 c.c. | <u>v.P</u>) |
| Ulmus sp. | 1 |
| artemisia verlotorum | |
| | 5 |

| Portulaca oleracea | 5 | |
|---|--------------------|--|
| Trifolium sp. | 2 | |
| Mata rastrera sin/rec. | 1 | |
| Flor amarilla | 2 | |
| Eragrostis neomexicana | 72 | |
| Total: | 93 | malezas |
| Parcela Nº. 8 Testigo | | |
| Ulmas sp. | 4 | |
| Artemisia verlotorum | 104 | |
| Sonchus oleracea | 17 | |
| Trifolium sp. | 2 | |
| Eragrostis neomexicana | 262 | |
| | | |
| name : | | |
| Total: 2 | 289 | malezas |
| Total: Recuento de malezas al | _ | |
| | 13/1 | 11/1961 |
| Recuento de malezas al | 13/1 c. V. | 11/1961 |
| Recuento de malezas al Parcela Nº. 1 . (400 c. | 13/1 c. v. | <u>11/1961</u> P.M.) |
| Recuento de malezas al Parcela Nº. 1 . (400 c. Acacia blanca | 13/1 c. V. | 11/1961 P.M.) 8 |
| Recuento de malezas al Parcela Nº. 1 . (400 c.) Acacia blanca Acacia trinervis | 13/1 c. v. | 11/1961 P.M.) 8 |
| Recuento de malezas al Parcela Nº. 1 . (400 c.) Acacia blanca Acacia trinervis Eragrostis neomexicana | 13/1 c. v. | 11/1961 P.M.) 8 1 |
| Parcela N°. 1 . (400 c. Acacia blanca Acacia trinervis Eragrestis neomexicana Eleusine tristachya | 13/1 e. v. | 11/1961 P.M.) 8 1 0 |
| Recuento de malezas al Parcela Nº. 1 . (400 c.) Acacia blanca Acacia trinervis Eragrestis neomexicana Eleusine tristachya Euphorbia serpens | 13/1 c. v. | 11/1961 P.M.) 8 1 0 2 |
| Recuento de malezas al Parcela Nº. 1 . (400 c.) Acacia blanca Acacia trinervis Eragrestis neomexicana Eleusine tristachya Euphorbia serpens Acacia aroma | 13/1 c. v. | 11/1961 P.M.) 8 1 0 2 4 3 |
| Recuento de malezas al Parcela N°. 1 . (400 c. 6 Acacia blanca Acacia trinervis Eragrestis neomexicana Eleusine tristachya Euphorbia serpens Acacia aroma Amaranthus gracilis | 13/1 c. v. 3 | 11/1961 P.M.) 8 1 0 2 4 3 |

| Ligustrina sinensis | | 1 | |
|---------------------|--------|----|---------|
| Pichus echioides | | 1 | |
| Sida spinosa | | 1 | |
| Cynodon dactylon | | 1 | |
| Schinus molle | | 1 | |
| Lantana camara | | 1 | |
| | Total: | 77 | malezas |

Nº. de plantas (Parcela Nº. 1/400 c.c.):

Filas de derecha a izquierda:

- 1) 224
- 2) 233
- 3) 250
- 4) 235
- 5) 220

1157 plantes

Parcela No. 5 (Testige) .-

| Eragrostis neomexicana | 80 |
|------------------------|----|
| Lantana camera | 1 |
| Acacia blanca | 1 |
| Sporobolus poiretti | 1 |
| Tipuana tipu | 1 |
| Acacia trinervis | 1 |
| Cynodon dactylon | 1 |
| Sonchus oleracea | 3 |
| Taraxacum officinalis | 2 |

| Portulaca oleracea | 1 | |
|------------------------|--------------|------------|
| Fresnos | 3 | |
| Euphorbia serpens | 3 | |
| Oxalis sp. | 4 | |
| Ciperaceas | 1 | |
| Acacia aroma | 1 | |
| Eleusine trystachia | 1 | |
| Galinsoja parviflora | 162 | |
| Sida spinosa | 1 | |
| Apium ammi | 1 | |
| | Total: 271 | malegag |
| TA | • | |
| Nº. de plantas: Filas | de derecha a | izguierda: |
| 1) 189 | | |
| 2) 221 | | |
| 3) 218 | | |
| 4) 189 | | |
| 5) 222 | | |
| 1039 malezas | | |
| _ | _ | |
| Parcela Nº. 2 (200 c. | c. V.P.M.) | |
| Acacia trinervis | 5 | |
| Eragrostis neomexicana | 31 | |
| Robinia pseudoacacia | 3 | |
| Sonchus oleracea | 9 | |
| Euphorbia serpens | 7 | |
| Cynodon dactylon | 5 | |
| | | |

| Portulaca olerace | e. | 1 | |
|------------------------------------|-----------|--------|---------------|
| Fresnos | | 5 | |
| Acecia aroma | | 3 | |
| Leguminosas sp. | | 1 | |
| Salpichroa origan | ifolia | 1 | |
| Anacahuita | | 1 | |
| To | tal: | 72 | malezas |
| Na. de plantas: F | Filas de | derech | a izquierda : |
| 1) 190 2) 189 3) 186 4) 157 5) 163 | | | |
| 885 plantas | | | |
| Percela Nº. 6 (T | Cestigo). | - | |
| Lantana cemera | | 1 | |
| Sonchus cleracea | | 6 | |
| Fresnos | | 4 | |
| Eragrostis neome | kicana | 47 | |
| Digitaria sanguir | nalis | 3 | |
| Portulaca olerace | ea | 4 | |
| Oxalis corriculat | ta | 4 | |
| Acacia blanca | | 1 | |
| Dichondra repens | | 1 | |
| Sida spinosa | | 1 | |
| | Total: | 71 | malezas |

N°. de plontes .- Filas de derecha a izquierda (del lado del cantero).-

- 1) 147
- 2) 142
- 3) 173
- 4) 153
- 5) 139
 - .754 plantas

Parcela Nº. 3 .- (600 c.c. V.P.M.)

| Eragrostis neomexicana | 239 |
|------------------------|-----|
| lanicum bergii | 4 |
| Euphorbia serpens | 5 |
| Acacia trinervis | 2 |
| Ulmus sp. | 3 |
| Fresnos | 8 |
| Graminea | 1 |
| Acacia aroma | 3 |
| | |

Total: 265 malezas

No. de plantas: Filas:

- 1) 111
- 2) 170
- 3) 192
- 4) 202
- 5) 195
 - 870 plantas

Parcela No. 7 (Testigo) .-

| Eragrostis neomexicana | 389 |
|-------------------------------|----------|
| Panicum bergii | 30 |
| Digitaria sanguinalis | 2 |
| Artemisia verlotorum (Ajenjo) | 23 |
| Ulmus sp. | 12 |
| Mburucuyá | 1 |
| Sonchus pleracea | 4 |
| Apium ami | 16 |
| Erigeron bonariensis | 2 |
| Freenos | 4 |
| Galinsoja perviîlora | 1 |
| Guaphalium spicatum | 5 |
| Stellaria media | 1 |
| Eurphorbia serpens | Ą. |
| Potal: | <u> </u> |

Nº. de plantas: Filas de derecha a izquierda:

malezas

- 1) 1.62
- 2) 152
- 3) 193
- 4) 180
- 5) 184
 - 871 plantas

Parcela No. 4 (300 c.c. V.P.H.) .-

Eragrostis neomexicana 272

Panicum bergii 6

| Digitaria sanguinalis | 1 |
|---------------------------------------|----|
| Adenjo (Artemisia sp.) | 10 |
| Sonchus oleracea | 6 |
| Portulaca oleracea | 1 |
| Fresnos | 2 |
| Galinsoja parviflora | 1 |
| Apium amui | 1 |
| Medicago hispida | 1 |
| Acacia aroma | 1 |
| Euphorbia(aroma) serpens | 6 |
| Dichondra repens | 4 |
| | - |

Total: 312 malezas

Nº. de plantas .- Filas de derecha a izquierda .-

- 1) 151
- 2) 191
- 3) 194
- 4) 213
- **5)** 195

944 plantas

Parcela No. 5 .- (Testigo) .-

| Artemisia verlotorum | 120 |
|------------------------|-----|
| Eragrostis neomexicana | 242 |
| Sonchus oleracea | 14 |
| Ulmus sp. | 6 |
| Digitaria sanguinalis | 9 |

| Panicum bergii | | 14 | |
|-------------------|--------|-----|---------|
| Apium ammi | | 18 | |
| Compositaceas | | 1 | |
| Fresnos | | 1 | |
| Euphorbia serpens | | 5 | |
| | Total: | 430 | malezas |

No. de plantas.-Filas de derecha a izquierda.-

- 1) 151
- 2) 131
- 3) ---
- 4) 146
- 5) 157

585 plantas

Se omitió la siembra de la fila del medio.-

En las próximas etapas de este ensayo, que se realizarán en el trang curso de los meses invernales del año 1961, se procederán a realizar las siguientes operaciones:

- a) Se contarán nuevamente las malezas.-
- b) " " plantas de P. insignis en cada fila de cada parcela.-
- c) Se arrancarán los pinos para: 1º) Hacer pesadas del total de plantas por filas.-
 - 2°) Medir alturas y diámetros de 30 pinos en cada fila.-
 - 3°) Pesar tallos .-
 - 4°) Pesar raices.-

Ensayo en parcelas de Pinus radiata con producto V.P.M. (Dupont)




Izquierda: Parcela tratada Derecha: Parcela no tratada




Parcela tratada con 400 c.c. de V.P.M.



Izquierda: Pino radiata proveniente de parcela tratada:-Derecha: Pino radiata proveniente de parcela sin tratar.-



Macetas con plantas provenientes de parcelas tratadas.-



Ensayo: Herbicida fungicida V. P.M. (De Especie: Pemo radiuta II PARTE

CVINOTECNIA

Selección de majadas generales en la zona del Vete de nuestro país.-

a) Factores que deben incidir en la selección de la majada general.-

Cuando un experto se halla ante el grave problema de la selección de una majada general, responsabilidad enorme si consideramos que esta selección constituirá la base de la futura producción lanera, al encausar a los lotes ovinos hacia un incremento de calidad y cantidad del producto lanero, así como también en las rezas especializadas en la producción de carne y sus cruzas a la obtención de un producto, como lo es la carne ovina, de amplias perspectivas para el desarrollo de nuestra economía, deberá tener muy en cuenta una serie de factores que estarán relacionados principalmente con los individuos a seleccionar, y con el ambiente en el cual se encuentran.

Es entonces que se deberá prestar especial interés a la conformación y constitución de los animales, a su promedio actual de producción de lana y calidad de esta, y no depender exclusivamente de las características dadas por los Standards de cada una de las razas explotadas. Je debe seleccionar la majada general con un criterio eminentemente práctico y seguro, buscando animales de buen cuerpo y hueso, productores de una buena cantidad de lana.

Se dete comenzar la selección examinando el lote en su totalidad para formarse una idea general de su uniformidad y de su grado de calidad. El experto debe situarse un poco individualmente frente a cada lote, para poder tener un criterio práctico de selección. Si en el lote con el cual se va
a trabajar predomina un defecto cualquiera, que se encuentra
en casistodes los animales, no es conveniente exigir mucho en
ese aspecto pues entonces se corre el riesgo de quedarse al
final con muy pocos animales.

Se comenzará el refugo de los ovinos por aquellos animales que presenten deficiente constitución y conformación, es decir que seam de constitución ósea pobre, que tengan aplomos muy defectuosos(pata de catre, etc.), que tengan una cabeza atípica, estrecha a la altura de las orejas, cara extremadamente larga, cruz alta y mal insertada, muy estrechos en el encuentro, fajados en las paletas, lomo "sillón" o viceverba, etc. y también aquellos animales muy viejos que no sea ya económico mantenerlos en la majada.

Debe tembién prestarse atención para realizar el refugo, antes de entrar a la apreciación del vellón, a las manchas que pueden aparecer en diferentes partes del animal, como
ser patas, hocicos, parfados y orejas, principalmente. Deberán
refugarse los animales que presenten manchas siempre que las
mismas se encuentren en gran proporción, estimándose que para
la selección de una majada general, siempre y cuando que las
ovejas que presenten menchas sean de buena compormación, constitución y vellón, no debe ser el apartador muy exigente en cuanto a este aspecto como lo será cuando se vaya a la selección
de un plantel. (Se entiende que esta tolerancia debe aplicarse solamente en majadas en los cuales recién se está comenzan-

do la selección, no así en aquellas en las cuales ya se ha estado trabajando durante algún tiempo, en las que se aplicará un criterio riguroso en cuanto a este defecto.)

En cuanto a la epreciación del vellón, se buscará en forma principalicima en todo trabajo de edección en primer lugar el aumento de centidad de lana por animal, factor esto que se ha mantenido estancado en nuestras majadas por mucho tiempo. Se ha llegado a una excelente calidad lanera, con algunas majadas destacadas también en cuanto a su cantidad de producción, pero el promedio general del país sigue siendo bajo. Se debe entonces buscar pero en las majadas, aunque también debe prestarse especial atención a la calidad del vellón. Se refugarán todos los animales que presenten, de acuerdo a la raza que predomine en ellos, una lana demasiado gruesa, o demasiado fina, o que tenga una mecha muy corta, o que presenten pelos, o que tengan lana de barriga alta, es decir que se macuentre el característico ricillo subiendo por los costillares; también aquellos que tengan un vellon de escasa donsidad, de inferior calidad, desuniforme en cuanto a su finura, etc.

Se debe tener en cuenta también que todo seleccionador menor importancia a todos aquellos caracteres que no afecten la producción, aunque sin descuidarlos bajo ningún concepto.

Es interesante destacar, que a través de las recorridas por todo el país los expertos de la Comisión H. de Lejoramiento Ovino pueden comprobar que entre nuestros productores se ha ido estabilizando firmemente el concepto de la selección de la raza ovina a críar en base al tipo de campo predominante en sus establecimientos y al medio ambiente en general. Ya no sucede tanto como en tiempos pasados de encontrar majadas que tendían a la raza Herino criadas en campos bajos, ni majadas tipo Romney Marsh criadas en campos de sierras; asimismo tampoco se encuentran productores que echen carneros de diferentes tipos y finura a sus majadas todos los años, según la cotización y demanda de los diferentes tipos de laras en el mercado. Puede decirse que estos factores han sido comprendidos por nuestro hombre de campo al tener a la vista, en materia económica, los regultados obtenidos.

ciados anteriormente, debe ser de tratar de lograr entonces una mejor calidad y uniformidad de la majada general, haciendo para ello que el productor rurel trabaje con la raza indicada para su campo, dejando de lado preferencias y antojos, como nes en otros tiempos, para poder lograr ahora una mayor calidad y producción de lana, esí como también una conformación y constitución óptimas en sus animales. Para lograr este objetivo, se tiene que usar para con el productor rural que inicia la selección de sus majadas un criterio constructivo, tratando, si la majada es medianamente aceptable, de refugar pocos animales en las primeras visitas, usando un criterio amplio y benigno en este sentido, para ir haciándose luego más riguroso a medida que la majada en particular va mejorando o través del tiempo.

Aunque lo ideal seria, cuando el experto se encuen-

tra frente : una majada muy ordinaria, compuesta por un gran porcentaje de ovejas que presentan cuartos peludos, acriolladas, cen una finura de lana que varía por todo el vellón, con costituciones y conformaciones sumamente defectuosas y débiles, tratar de que el productor se deshiciera de todo el lote y que comenzara con una nueva majada, generalmente esto no es posible por variadas causas de índole aconómico y el técnico tendrá entonces que tratar de mejorar la majada que tiene a la vista.

También se considera en Mejoramiento Cvino que se debe hacer partícipe al propietario de la majada a seleccionar de las razones que usa el experto para refugar cada oveja en particular, enseñando de este modo las directivas generales a seguir y los fundamentos del tipo de animal y del vellón y clase de lana buscados. Será sólo así que la tarea de un experto se ves coronada con éxito, al hacer que los productores rurales se conviertan ellos mismos en seleccionadores de sus propias majadas.

b) Selección de planteles .-

Un la selección de planteles, en cambio, el criterio será en todos los casos más ajustado, debiéndose tener
en cuenta en meyor grado las características raciales, pues
no debemos olvidar que se está formando padres para todas las
majadas del país.

Al igual que para la majada general, deborá exeminarse en primer lugar el lote en conjunto, refugando todos los
animales que presenten defectos graves, para luego ir al examen de cada uno fijando especial atención en sus característi-

cas de constitución, conformación y cualidades del vellón. Se revisará la boca, los caracteres raciales, el vellón, testículos, etc.

Actualmente en nuestro país se dividen los planteles en tra categorías:

- lo.) Flanteles de pedigree .-
- 20) Planteles purcs por cruza(de simple tatuaje) .-
- 30.) Planteles puros por cruza(de doble tatuaje) .-

Jacas seleccionadas por su tipo y aptitudes laneras, constituídas por animales hembras, ovejas y borregas, en cuya producción
deten haberse usado buenos carneros padres, por lo menos durante un periodo de seis años. Estos animales son tatuados por los
expertos de la Comisiónio de Rejoramiento Cviño, con el tatuaje de esa Comisión en la oreja derecha, debiendo ucarse posteriomente en estos planteles aceptados padres de pedigree aceptados por la Comisión o carneros de doble tatuajo. La progenie
de esto, cruzomientos es tatuada a su vez si reúne las condiciones exigidas, en caso contrario los machos con castrados y
las hembras pasan a formar parte de la majada general si no reunen un buen tipo racial y lanero.

los planteles puros por cruza de doble tatuaje a su vez estín formados por ovejas seleccionadas de los planteles de tatuaje simple, desde la segunda generación, o también por animales de majadas de encelente tipo racial en las cuales se justifique haber usado carneros de pedigree en la cantacad su-liciente por lo menos durante un lapso de diez años. (También

pueden haberse usado carneros de doble tatuaje.-)

A estos lotes se las tatúa también con el tatuaje de la Comisión N. de Rejoramiento Ovino, pero además se les tatúa también con un tatuaje especial perteneciente a la Sociedad de Criadores correspondiente a cada raza. A estos planteles de doble tatuaje se les echarán carneros de pedigree o de doble tatuaje a su vez aceptados por la Comisión de Mej. Cvino, y la producción que de estos planteles se obtenga irá a engrosar a su vez las categorías de simple o de doble tatuaje.

c) Clasificación de majadas generales de las siguientes razas:

Majada No. 1 .- Raza Corriedale .-

Majeda No. 2 .- Haza Romney Marsh .-

Pajada No. 3 -- Raza Ideal .-

Enjada Do.4.- Raza Herilin.-

Majada No. 1 .- Raza Corriedale .-

Standerd de la raza:

Aspecto general y conformación: El Corriedale es un ovino de doble propósito: carme y lama. Ambos fines tienen igual importancia. Su aspecto general es el de un animal rústico, de buen tamaño, formas equilibradas y líneas bajas.

Cabeza: Ancha, corta, fuerte y sin cuerños. El cránco abultado es un defecto. Las orejas son fuertes, de mediana longitud, bien emplazedas y cóncavas hacia adelante. Las orejas desprovistas de pelos o con excesiva población de lana, son defectuosas.

Las orejas caícas o insertadas en la parte superior del cráneo muy cerca una de otra, constituyen un defecto. Es también defectuoses la oreja con manchas marrones, pero no así la que tenga manchas negras o esculadas.

la piel de la cara y alrededor de los ojos dete estar densamente cubierta de polo blenco sin manches ni sombras marrones, violáceas, azules o negras.

El Corriedtle deberá tener la vista libre, a través de un canal limpio de lana, o sólo cubierto de lanilla, a lo largo de la nariz. La ceguera producida por exceso de lana es un defecto. El cráneo y la nuca estarán cubiertos de lana de buena calidad,

libre de "hemps", formando un copete ancho y saliente, que no invadirá más allá de la m dia distancia entre los ojos y la neriz. Trompa ancha, fosas nasales bien abiertas y negras, siendo preferible el tono negro uniforme. La trompa y fosas naceles totalmente rocadas o con manchas marrones, son defectos.

Cuello y paletas: El tren anterior deberá ser amplio, el cuello corto y musculoso, sosteniendo la cabeza erguida.

Las paletas anchas y profundas, manos bien ceparadas y verticales. El cuello hundido delante de las paletas es un defectom.

Lomo y contillas: Lomo horizontal, derecho y ancho. Costillas

profundas y bien arqueadas, sin caída • faja detrás de las paletas.

Cuartos: Anchos y hondos; buena separación entre las patas; garrón corto y fuerte,

Aplomos: Extremidades de buen hueso, poca longitud y aplomos verticales. Patas cubiertas con lana libre de "kemps" hasta las

pezuñas. Las manos peladas constituyen un defecto. Fezuñas negras o con estrías negras. Las cuatro pezuñas totalmente blancas es defecto. Son defectos las manchas y sombras negras o marrones, aunque solo afecten la piel.

lana: El vellón deberá ser voluminoso y su cualidad esencial será la uniformidad en densidad, longitud y finura. La lana deberá ser vigorosa, de carácter, rizada, suave al tacto y de brillo sedoso. La lana de barriga, dentro de su aspecto característico, tendrá densidad, longitud, rizo y suavidad, pero deberá estar riguriosamente circunscripta a su región. La finura deseuda es la de B y 1 (58s.- 56s.) en las hembras y 1 - 2 (56s. y 50s.) en los machos. La mecha mínima será en todos los casos de 12 cms.

Se trabajó con una majada Corriedale formada por 30(treinta) borregas, que formaban parte de la majada general, refugándolas por los siguientes defectos:

| 1) kala cabeza | 10 | animales | refugados |
|----------------------------|----|------------|---------------|
| 2) halos aplomos | 8 | 17 | 17 |
| 3) Cuerpo defectuoso | 11 | 78 | 15 |
| 4) Fana de baja calidad | 12 | 11 | 16 |
| 5) Isma fine | 7 | \$2 | 31 |
| 6) ana corta | 9 | . 11 | tē |
| 7) Vellon de poca densidad | 10 | 1 8 | ŧī |
| 8) Lana de barriga alta | 8 | έξ | 16 |
| 9) lunares | 3 | ŧŧ | 11 |
| 10) Patas conclas | 3 | 推 | .1 |

(Ver planilla y gráfica adjuntas.-)

Sexo: Hembras(Rechazadas) .-

| _ | - |
|-------------------|-----|
| CAS | 200 |
| 1,000 | 162 |
| | ,, |
| The second second | - |


| lofectos | 1 | 2 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|----|---|---|----|----|----|----|----|------------|
| Cabeza atípica | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cabeza mala | X | | | | | x | | | | | | x | | | . 7 |
| Malos aplomos | x | | | | | | | x | | | | x | x | | |
| Cuerpo malo | x | | | | | X | | x | | | | | x | | x |
| Lana baja calidad | | ĸ | | | | x | | | | x | x | | x | | |
| 4 fina | | x | | | | | 22 | | | | x | x | | | |
| " Kruesa | | | | | | | | | | | | | | | |
| " corta | | x | x | | | X | | Σ | | x | | | | | |
| a poca densidad | | x | x | | | x | | x | | K | | | | | |
| " barriga alta | | | | X | | | x | | x | | | | | x | |
| Cuartos peludos | | | | | | | | | | | | | | | |
| Telo fuerto | | | | | | | | | | | | | | | |
| lanilla lomo | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pigmentos | | | | | | | | | | | | | | | |
| unares | | | | | x | | | | X | | | | | | |
| Frognatismo | | | | | | | | | | | | | | | |
| Monorquideos | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fatas cancla | | | | | | | | | x | | | | | x | |

Raza: Corriedale

Sexo: Hembras (Rechazadas) .-

<u>Ovejas</u>

| Defectos | 32 | 16 | <u> 17</u> | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | <u>3</u> 0 | _ |
|-----------------|-----|----|------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------------|---|
| Cabeza atípica | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cabeza mala | | x | | | x | | | | x | x | | | | x | | x | |
| Malos aplomos | | | | | x | x | | x | | x | | | | | | | |
| Cuerpo malo | | | | | | x | x | | x | x | | | | x | | x | |
| Lana de baja ca | al. | x | | | | x | x | | | 3 | ĸ | x | | x | | x | |
| " fina | | x | | | | x | | | | | | | | x | | | |
| " gruesa | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| " corta | | | x | | | | x | | | | | x | | x | | | |
| " poca densid | lad | | x | | | | x | | | | | x | | x | | x | |
| " barriga ali | ta | | | x | | | | | | | | x | | | x | x | |
| Cuartos peludos | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Felo fuerte | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lunilla lomo | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pigmentos | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lunares | | | | | | | | | | | | x | | | | | |
| Prognatismo | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Monorquideos | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fatas canela | | x | | | | | x | | | | | | | | | | |



Majada No. 2 .- Raza Romney Harsh .-

Standard de la reza:

Aspecto general: Euen tamaño, esqueleto fuerte, cuerpo compacto y armonioso, lineas bajas, movimientos ágiles y pisada firme.

Cabeza: Ancha, fuerte y sin cuernos.

Frente: Plana, ancha entre los ojos y las orejas, cubiertas de lana de buena calidad hasta el nivel de los ojos.

Cara: Ancha, acortada, de perfil ligeramente convexo, cubierta de pelo blanco, fuerte y abundante.

Hocico: Fuerte, negro, sin arrugas pronunciadas, con ollares anchos y bien abiertos, labdos pigmentados, deshechándose las narices y labios blancos y rosados.

Orejas: Separadas, bien sostenidas, grandes y anchas con la cuenca hacia adelante y cubiertas de pelo suave, corto y color blanco, pudiendo presentar manchas o lunares negros pero no marrones.

Ojos: Grandes y vivaces, con el borde de los párpados sombreados.

Tipo y conformación.

<u>Tescuero</u>: Corto, ancho, fuertemente insertado con la cabeza y armonionamente unido con las paletas.

Jecho: Ancho y profundo, ligeramente saliente.

Paletas: En línea con los costillares y terminadas por una cruz ancha y nivelada con el lomo.

Fronco: Lecto, ancho y de mediana longitud, lomo recto, fuerte y carnudo, costillar profundo y ligeramente arqueado.

Crupa; Amplia, chata y carnuda con la cola casi a su nivel.

Cuartos: Anchos y macizos. Frofundos de la cola a latentrepierna.

Miembros: De buen hueso, cortos, separados y aplomados, de color

blanco. Corrones, rodillas y nudos fuertes, pichicos cortos. Fezuñas negras y grandes.

Lana:

Calidad: Vigorosa, de rizo parejo, semi - lustrosa, suave al tacto con suarda amarillenta, tolerándose la lana fuerte en el jamón cuando esta conserva calidad.

Uniformidad: Conjunto parejo dentro de una finura que puede ir del 2 al 3 fuerte en los machos y del 1 fuerte al 3 en las hembras. La lana de barriga en cantidad normal circunscripta a su región.

Largo: De buena mecha.

Densidad: El vellón derá denso en todas sus partes.

Observaciones:

Cara: Se tolerará solamente alguna mencha negra en la región de pelo, siempre que no sea mayor que un grano de maíz. Las manchas marrones se consideran defecto grave.

Miembros: Se tolerarán pelos marrones cuando sean poco visibles, en la parte posterior de las cañas traseras. Los cascos deben ser negros, tolerándose pequeños estrías blancas.

Lera: Se consideran defectos graves las manches de lenas débiles (tipo barriga) en el lomo, siendo eliminatorio si estes manches toman excesiva extensión.

Chilla: se considera defecto grave su presencia en los cuartos y eliminatorio cuando es abundante.

Densidad: Se considera que en el lomomel vellón tiene menor densidad, no considerándose defecto grave si esta lana no pierde caracter.

Raza: Romney March

Sexo: Membras (Rechazudas) .-

| Defectos 1 | 2 |) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ç | 3 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-------------------|----|---|---|---|------------|---|----|---|------|------------|----|-----|----|----|
| Cabeza atípica | | | | | | | | | | | | | | |
| Cabeza mela | | | x | | | | | | | | | | | |
| dalos aplomos | | | | | | | | | | | | | | |
| Cuerpo malo | | | × | | | | | | | | | | | |
| Lana de baja cal. | i. | X | | x | x : | x | | | x | | x | | x | x |
| " fina x | | x | | | | | x | | | x | | x | | x |
| ° gruesa | | | | | | | | | | | | | | |
| corta | | | | | | | | | | | | | | |
| "poca densidad | | | | | | | | | | | | | | |
| " barriga al.x | | x | | | | | | x | | | | 38. | | |
| Cuartos pelados | | | x | x | x | | | | x | X . | | | | |
| lelo fuerte | | | | | | | | | | | | | | |
| Ianilla lomo x | | x | | | | | | | | | | X | x | |
| Pignentos | | | | | | | | | | | | | | |
| lunares | x | | | | | 2 | X. | | x | | | | | |
| Progratismo | | | | | | | | | | | | | | |
| Lonorquideos | | | | | | | | | | | | | | |
| Patas canela | x | | x | | x | 2 | x | | x | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

Sexo: Hembras (Rechazadas) .-

| Defectos | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 2 | 6 2 | 7 2 | 8 2 | 9 30 | |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|------|----|------|-----|-----|-----|------|--|
| Cabeza atípica | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cabeza mala | x | | x | | | | | | x | | | | | | |
| Malos aplomos | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cuerpo malo | | | x | | | | | | | | | | | | |
| Lena de baja ca | 1. | x | | ж. | x | | | | | X | x | | | x | |
| " fina | | x | | x | 2 | C | | | x | x | | x | | | |
| " gruesa | | | | | | | | | | | | | | | |
| " corta | | | | | | | | | | | | | | | |
| " poca densid | ad | | | | | | | | | | | | | | |
| "barriga alta | | x | | | | | 2 | ĸ | | x | | | x | | |
| Cuartos peludos | x | | x | | | | | | 3. | | x | | | | |
| Pelo fuerte | | | | | | | | | | | | | | | |
| lanilla lomo | | | | x | X | | | | x | | | Σ. | x | x | |
| Figmentos | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lunares | x | | | | ¢. | x | | | | | | | | | |
| Frognatismo | | | | | | | | | | | | | | | |
| Monorquideos | | | | | | | | 20.2 | | | | | | | |
| Patas cunela | | | | | | | x | X | | | X | | | | |

23-Kazal Bannay March 76 -24-23-. . 2/ -201 19-137 117 格士 15 14 -13 -12= 11 -10+ 8 + Lana

Se trabajó para esta reca también con una majada general, refugándose treinta borregas por los siguientes defectos:

| 1) Mala cabeza: | 4 | animales | refugados |
|---------------------------|--------|-----------------|-----------|
| 2) Cuerpo malo: | 2 | Ħ | 11 |
| 3) Baja calidad de lana: | 14 | iŧ | 11 |
| 4) Lama fina: | 12 | 21 | 17 |
| 5) lana de barriga alta: | 8 | \$ 7 | 14 |
| 6) lamilla en el lomo: | 10 | iŧ | 11 |
| 7) Cuartos peludos: | 9 | ìf | ŧŧ |
| 8) Lunares: | 5 | :₹ | žΫ |
| 9) Patur canelas: | 8 | fi . | 18 |
| (Ver planillas y gráfica | adjunt | as) | |

Majada 10.3 - Raza Ideal --

Standard de la raza:

Características raciales:

Cabeza de tamaño medi no, proporcionada y erguida, demostrando vigor, libre de tocos fijos y guampas, cubierta de lana hasta la línea de los ojos. La cara algo convexa, ancha, más bien corta y cubierta de pelo blanco y sedoso. Orejas de mediana longitud cubiertas de pelo blanco y fino y libres de lana: más bien chicas y cóncavas con tendencia hacia abajo, debiendo estar colocadas a buena distancia una de otra, demostrando una nuca amplia. Ojos medianos y vivaces, prefiriéndose sin pignentación en los p;rpados y adyacencias. Nocico fuerte, rosado, sin arrugas pronuncia-

das, con ollares amplios y labios rosados, tolerándose pequeñas manchas de pigmentación.

Conformación: Lentro de una talla mediana, debe reunir todas las caracterícticas de un ovino bien conformado y armonicao, con extremidades más bien cortas, hueso fuerte no muy grueso, buenos aplomos y pezuñas blancas, tolerándose paqueñas estrías. El cuello más bien corto y lleno, pecho medianamente profundo, libre de collares pero tolerándose el delantal. Paletas bien adheridas, guardando línea recta con el costillar. Lomo recto am lio en toda su longitud y especialmente en las cruces, contribuyendo así a una mejor armonía y vigor del conjunto. Tronco macizo y de acdiana longitud. Costillar profundo y ligeramente arqueado. Crupa amplia y bien proporcionada.

Lana: Siendo en la raza Ideal su predominante característica, debese ser exigente en todo lo que se relaciona con su calidad y
cantidad. Debe tonerse muy en cuenta: la maca del vallón, su uniformidad, densidad y longitud y finura de la hebra. La lana debe
ser de color blanco o marfil, suave al tacto, brillante, sedosa,
rizada y vigorosa. La finura deseada (de acuerdo al Standard australiano) se fija entre 58s. y 60s. tolerándose en las hembras
hasta el 60s./64s., con un largo mínimo de mecha de 10 cms. La
barriga debe estar recubierta con proferencia de lana de igual
calidad a la del vellón (vellón redondo) y buscándose en lo posible un buen garrec.

Al igual que para las razas anteriores, tomamos treinta borregas del lote refugado constatando los siguientes defectos:

Reza: Ideal


Sexo: Hembras (Rechazadas) .-

| Defectos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1.3 | 14 | 15 |
|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-----|----|----|
| Cabeza atípica | х | | | | | x | | | | | ж | | | x | |
| Cabeza mala | | | | | | | | | | | | | | | |
| Malos aplomos | x | x | | x | | x | | | X | x | | | x | x | |
| Cuerpo malo | ж | x | | x | | x | | | x | | | | | | x |
| lana de baja cal | • | | | | | | | | | | | | | | |
| " fina | | | | | | | | | | | | | | | |
| " gruesa | | | x | | | | x | x | | | | | | | |
| " corta | | X | | | | | | x | | | | | | | x |
| ipoca densidad | | x | | X | | x | | X | | | | | | | x |
| "berriga alta | | | | x | | | | | | x | | | x | | |
| Cuartos peludos | | | | | | | | | | | | X | | | |
| Pelo faerte | | | X | | | | | | | | | | | | |
| Lanilla lomo | | | | | | | | | | | | | | | |
| Figmentos | | | | | x | | | | | | | | | | x |
| lunares | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prognatismo | | | | | | | | | | | | | | | |
| Monorquideos | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zatas canela | | | | | | | | | | | | | | | |

Raza: Ideal

Sexo: Membras (Ruchazadas).-

| Defectos | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Cabeza atípica | | x | X | | | | x | | | | | x | x | x | |
| Cabeza mala | | | | | | | | | | | | | | | |
| Malos aplomos | | x | | | | x | | x | | x | | x | | x | x |
| Cuerpo malo | | x | | x | | x | | | x | | | x | | | x |
| Lana de baja ca | 1. | | | | | | | | | | | | | | |
| " fina | | | | | | | | | | | | | | | |
| a Emiesa | | | | | | | | | | | | | | | |
| " corta | | | | x | | | | X | | | | X. | | | |
| " poca densid | ad | | | x | | | | x | | | | x | | | |
| " barriga alt | a | | x | | | X | x | | | K | | | | x | x |
| Cuartos peludos | x | | | | x | | | | | | | | | | |
| Pelo fuerte | | | | | | | | | | | X. | | | | |
| Lamilla lomo | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pigmentos | | | | X | | | x | | | | | | х | | |
| Luna res | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prognatismo | | | | | | | | | | | | | | | |
| Monorquideos | | | | | | | | | | | | | | | |
| Patas canela | | | | | | | | | | | | | | | |



| 1) | Cabeza atípica: | 10 ani | imales | refugados |
|------|---------------------------|--------|------------|------------|
| 2) | halos aplomos: | 15 | PP. | \$# |
| 3) | Cuerpo defectuoso: | 12 | 18 | ŧŧ |
| 4) | Lana gruesa: | 3 | Ħ | 44 |
| 5) | Lana corta: | 6 | ħi | 11 |
| 6) | loca densidad del vellón: | 8 | 11 | 17 |
| 7) | lana de barriga alta: | 9 | ₽ŧ | ti |
| (3) | Felo fuerte: | 2 | ₹ ₹ | †1 |
| 9) | tuartos peludos: | 2 | 4.5 | † † |
| 10) | Pigmentos: | 5 | έ¥ | 1.2 |
| 1510 | | 1 | | |

(Ver planilla y gráfica adjuntas).-

Mejada Mo.4 .- Raza Merilin .-

Standard actual de la raza: (Na sido declarada raza).-

Propositos: Froducción de lana bastante fina, de la clasificación de nuestro mercado, Frima A y B y No.1. Producción de carne, en 20. término, pero de excelente resultado.

Aspecto y caracteristicas generales del Merilin:

Un animal robusto, de buen tamaño, con ciertos rasgos de conformación tirando más bien al bincoln, si bien atenuados por la sangre serina en lo que deben serlo y lo son, para generar las cualidades de un vellón denso, parejo y una est uctura general maciza; de miembros de una longitud media, que acusan armonía en el conjunto desarrollado del animal, sin las exageraciones de los tipos llamados corrientemente" may petizós" y cuya procura sistemática conduce a los animales demasiado chicos, sin superficie de piel suficiente para un vellón voluminoso y de buen peso

y sin el desenvolvimiento corporal necesario para producir corderos del peso exigido a poca edad y de capones rendidores de grandes vellenes.

la cabeza del Herilín es maciza, más bien corta, de proporcionada anchura, sin cuernos, amplia la nuca, cubierta de lana de buena clase, que forma vigoroso copete y desciende hasta algo más abajo de la linea que puede trazarse de ojo a ojo. Las orejas son de mediano tamaño, de cartilago espeso, con pelos cortos, blancos, con o sin manchas negras, su colocación lateral forma armomiogo comjento con la nuca. Los ojos son vivaces, de parpados firmes y van acompañados de lagrimales espaciosos y limpios. El hocico es fuerte, amplio, de longitud proporcionada, generalmente pignentado y con pelo blanco, sobre fondo oscuro: en los plenteles de selección se exigirá una pigmentación correcta. En animales que reunan en muy buen grado las principales cualidades positivas es tolerable en las hembras que la pigmentación de hocico, labios sea mínima, por la dificultad de reducir estas cualidades en el mismo sujeto, con un vellón típico y de punta totalmente pareja. La conformación del cuello y paletas del Lincoln, es una de las caracteristicas que más se trasmitieron al nuevo tipo. El Merilín tiene el cuello macizo, corto, erguido; la cruz amplia, paletas vigorosas, profundas y bien adheridas al tronco. Las manos son bien aplomadas, armoniosemente separadas, junto a un pecho lleno, sin exagerada caplitud. Lomo lleno derecho, de amplitud proporcionada. Costillas profundas, de buen arqueo, destacándose la perfecta unión del costillar y la paleta.

Tren posterior con cuartos que armonizan superiormente con la línea del lomo, para terminar en suave curva. Cuartos llenos, patas vigorocas, más bien cortas, con buena separación. Fezuña generalmente negra, aunque en animales de buen tipo esta caren cia no es motivo dexeliminación.

Vellón de punta pareja, denso, uniforme; la longitud de mecha en los animales jóvenes es de 10 a 12 cms. Buena calidad lanera en los cuartos, el vellón desciende hasta junto a la línea de la barriga, cubre la cabeza, las patas hastas las pezuñas. Finura va desde 60s. o 58s. en las hembras y de 58s. a 56s.en los machos.

Al igual que para las razas anteriores, se procedió a trabajar con treinta borregas del lote refugado, constatando los siguientes defectos:

| 1) | Cabeza atípica: | 10 | animales | refugados |
|----|--------------------------|----|----------|-----------|
| 2) | Cabeza mala: | 6 | 89 | R |
| 3) | Walos aplomos: | 14 | 11 | 17 |
| 4) | Cuerpo defectuoso: | 5 | п | 11 |
| 5) | Lana de baja calidad: | 12 | ** | Ħ |
| 6) | Lana corta: | 11 | (4 | 31 |
| 7) | Vellón de poca densidad: | 13 | tt | 17 |
| 8) | Lana de barriga alta: | 9 | Ħ | 9 |
| 9) | Lunares: | 2 | 88 | ιŧ |
| 10 |) Fatas canela: | 10 | 2 | 19 |
| | | | | |

(Ver planilla y gráfica adjuntas) .-

Nara: Merilin

Sexo: Nembras (Rechazadas) .-

Ovejas:


| Defectos 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | _8_ | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----------------------|---|---|---|---|---|---|-----|---|----|----|----|----|----|----|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Cabeza atípica x | | | x | | X | | | x | | | X | x | | |
| Cabeza mala | | | X | x | | | x | | x | | | | | |
| Malos aplomos x | x | | x | | X | | | X | x | | | x | | x |
| Cuerpo malo | | x | | | x | | x | | x | | | | | |
| Lana de baja calidad | x | | | x | | | x | | | x | | | x | x |
| ' fina | | | | | | | | | | | | | | |
| " gruesa | | | | | | | | | | | | | | |
| " corta | x | | | | | x | | | x | x | | | X | x |
| " poca densidad | x | | x | | | x | | | x | X | | | x | x |
| " barriga alta | | | x | | | x | | | | x | x | | x | |
| Cuartos peludos | | | | | | | | | | | | | | |
| Pelo fuerte | | | | | | | | | | | | | | |
| Lanilla lomo | | | | | | | | | | | | | | |
| Piguer tos | | | | | | | | | | | | | | |
| Lunures | | | | | | | | | | | | | | |
| Frognatismo | | | | | | | | | | | | | | |
| Monorquideos | | | | | | | | | | | | | | |
| gatas canela | x | x | | x | | | | | x | | | X | | |

Raza: Merilin

Sexo: Hembras (Rechazadas) .-

Cvejas:

| Bufuctos | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 2.8 | 29 | 30 |
|------------------------|----|----|----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|----|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cabeza atípica | x | | x | | | X | | | X | | | | | | |
| Cabesa mala | | | x | | | | x | | | | | | | | |
| Malos aplomos | x | | x | | | x | | | x | | | | | x | x |
| Cuerpo malo | | | | | | | x | | | | | | | | |
| Lana de baja calida | đ | x | x | | x | | x | | | x | | | | | x |
| " fina | | | | | | | | | | | | | | | |
| d gruesa | | | | | | | | | | | | | | | |
| " corta | | x | | x | x | | ; | x | | | | | | | x |
| " poca densidad | | x | | x | x | | ; | x | | x | | | | | x |
| " barriga alt a | | | | | : | χ | ; | x | x | | | | X | | |
| Cuartos peludos | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pelo fuerte | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lanilla lomo | | | | | | | | | | | | | | | |
| Figmentos | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lunares | | | | | | | | | | | | X | 3 | | |
| Progratismo | | | | | | | | | | | | | | | |
| Monorquideos | | | | | | | | | | | | | | | |
| Patas canela | x | | | x x | | | 2 | ζ | | | X | | | | |



14 22. 2.04 19.4 18 1 15 1 14-134 11.1 11 + 8 4 6+ 3 7. Cabrea Covera Halas