

RELACIÓN DEL AUTORREPORTE DEL ESTATUS TABÁQUICO CON LA MEDICIÓN DEL MONÓXIDO DE CARBONO EN EMBARAZADAS

Policlínica de Alto Riesgo Obstétrico del Hospital de Clínicas Dr. Manuel Quintela, año 2024

Estudio observacional, descriptivo y transversal en una población de mujeres embarazadas que se atendían en Policlínica de Alto Riesgo Obstétrico del Hospital de Clínicas entre agosto y septiembre, año 2024.

Recolección de datos: encuestas y medición de CO exhalado mediante un cooxímetro.



N = 36 mujeres embarazadas




Fumadoras
(exposición activa).



Exposición pasiva.



No expuestas
actualmente.



Se halló una relación significativa entre el autorreporte y el CO exhalado (valor $p < 0,001$); el análisis de Kruskal-Wallis mostró diferencias significativas en el CO exhalado entre grupos de exposición activa y no expuesta o pasiva (valor $p < 0,001$), pero no entre exposición pasiva y no exposición.

El método de autorreporte del estatus tabáquico de las pacientes fue efectivo;
se relacionó acertadamente con las mediciones de CO exhalado obtenidas.

La tendencia en esta población fue de admitir y expresar las características de su condición de tabaquismo.

